

agostada de los márgenes. Se distribuye por gran parte de la Península Ibérica. Citada de Navarra, Zaragoza, Teruel, Valencia, Jaén, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, Segovia, Salamanca, Valladolid, Santander, Guipúzcoa, Murcia, Canarias (**Burgos & Herrera**, 1986), Vizcaya (**Llorente & Pinedo**, 1988), Albacete (**Pardo et al.**, in litt), Ciudad Real (**Gómez & Pardo**, in litt.), Europa meridional, Madagascar y norte de África. Elemento mediterráneo-macaronésico.

GOMPHIOCERINAE

Ramburiella hispanica (Rambur, 1838)

MATERIAL ESTUDIADO

Medrila.- 1♂, 2♀n, 28-VI-90; 2♂♂, 4♀♀, 29-VII-90; 2♂♂, 6♀♀, 27-VIII-90. **Hoya.**- 3♂♂, 1♀, 26-VII-90; 1♀, 25-IX-90. **Corral.**- 1♀n, 28-VI-90; 2♂♂, 2♀♀, 26-VII-90; 3♂♂, 1♀, 25-IX-90. **C.Tiro.**- 1♀, 26-VII-90. **Casas.**- 3♂♂, 1♀, 2♀n, 28-VI-90; 1♂, 6♀♀, 26-VII-90; 3♂♂, 2♀♀, 29-VIII-90; 4♂♂, 4♀♀, 25-IX-90; 2♀♀, 23-X-90. **Cabras.**- 1♀, 28-VIII-90; 1♀, 25-IX-90. **Sotón.**- 1♂, 27-VII-90. **Cruz.**- 2♂♂, 26-IX-90. **Puntal de Meca.**- 1♂, 28-VII-90; 1♀, 25-VIII-90; 1♀, 26-IX-90. **Puntal del Mediodía.**- 3♂♂, 28-VII-90. **Rincón de Zapata.**- 4♂♂, 2♀♀, 28-VII-90. **Rincón del Pino.**- 1♀, 25-VIII-90; 1♀, 26-IX-90. **Cuerda del Mugerón.**- 5♂♂, 28-VII-90. **Pico Mugerón.**- 4♂♂, 28-VII-90.

Especie característica de los espartales, tanto densos como aclarados (**Presa & García**, 1982; **Aguirre & Pascual**, 1986). Altitudinalmente se establece a partir de los 700 m. Se presenta en una generación anual de Junio a Octubre, encontrándose el mayor número de individuos de uno y otro sexo durante el mes de Julio. Manifiesta clara preferencia por el matorral bajo, tanto en su forma aclarada como densa, siempre y cuando aparezca *Stipa tenacissima*, planta que le sirve de refugio. Se encuentra a lo largo de las costas este y sur de la Península Ibérica, incluida la atlántica, extendiéndose hacia el centro de Portugal y las provincias de Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. También se distribuye por el mediterráneo occidental: Francia mediterránea, Marruecos, Argelia y Túnez. Se trata de un elemento mediterráneo-noroccidental.

Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815)

MATERIAL ESTUDIADO

Hoya.- 2♂♂, 5♀♀, 27-VI-90. **C.Tiro.**- 3♂♂, 5♀♀, 28-VI-90; 1♂, 29-VII-90. **Plaga.**- 2♂♂, 2♀♀, 28-VI-90; 1♀, 26-VII-90. **Puerto.**- 5♂♂, 11♀♀, 28-VI-90. **La Cabeza.**- 6♂♂, 3♀♀, 28-VI-90. **Casas.**- 1♂, 28-VI-90. **Delgado.**- 8♂♂, 1♀, 27-VI-90; 3♂♂, 27-VII-90.

Ocupa el rango altitudinal comprendido entre los 800 m. y 1000 m. Presenta una fenología relativamente corta que abarca los meses de Junio y Julio, con máximo poblacional para ambos sexos en Junio. El tipo fisionómico de vegetación preferido es el matorral bajo con abundante pastizal en sus zonas aclaradas. Bajo determinadas condiciones ambientales es capaz de constituir plaga. Se encuentra en toda la Península Ibérica, aunque es muy rara en las provincias cantábricas. Su distribución