

altitudinal. Presenta una generación anual de Junio a Noviembre, con máxima densidad de individuos en Julio. El tipo fisionómico de vegetación preferido es el matorral bajo aclarado, entre cuyos elementos (*Thymus* sp., *Genista* sp., etc.) se instala un lastonar típico de *Brachypodium retusum*. Su distribución comprende el sur de Francia y la mitad oriental de la Península Ibérica. Citada de las cinco provincias castellano-manchegas (**Pardo** et al., in litt.). Es un elemento mediterráneo noroccidental.

PHASMOPTERA

PHASMATIDAE

Leptynia hispanica (Bolívar, 1878)

MATERIAL ESTUDIADO

Cabras.- 1♂n, 28-VI-90. **Rincón de Zapata.**- 1♂n, 29-VI-90. **Cuerda del Mugrón.**- 1♂n, 29-VI-90. **Pico Mugrón.**- 1♂n, 1♀n, 29-VI-90.

Especie capturada únicamente en estado ninfal, siempre por encima de los 1000 m de altura, sobre *Pistacia lentiscus*, *Quercus coccifera* o entre la densa vegetación herbácea que se acumula a sus pies. Se distribuye por los Pirineos orientales, base de los Alpes y la totalidad de la Península Ibérica. Elemento mediterráneo noroccidental.

DERMAPTERA

FORFICULINA

LABIDUROIDEA

CARCINOPHORIDAE

CARCINOPHORINAE

Euborellia moesta (Serville, 1839)

MATERIAL ESTUDIADO

Cabras.- 2♂♂, 18-V-90. **Torró Prado.**- 2♂, 13-XI-90. **Solana.**- 1♀, 17-V-90; 1♂, 24-X-90; 1♂, 13-XI-90. **Morón.**- 3♂, 2♀♀, 17-V-90; 2♂, 24-X-90. **Rincón del Pino.**- 1♀, 17-V-90.

Localizada bajo las piedras, preferentemente en pastizales agostantes de *Aegilops geniculata*, *Medicago littoralis*, *Bromus tectorum*, etc., con abundante sustrato al descubierto, entre los 830 m y los 1080 m de altitud. Se distribuye por el sur de Europa, ocupando la