

*Rivetina baetica* (Rambur, 1838)

## MATERIAL ESTUDIADO

**Medrila.**- 1 ♀n, 28-VI-90. **Corral.**- 3 ♂n, 28-VI-90. **Puerto.**- 2 ♂n, 2 ♀n, 28-VI-90; 2 ♂♂, 26-VII-90. **La Cabeza.**- 1 ♂, 26-VII-90. **Casas.**- 1 ♂, 25-IX-90.

Ocupa el rango altitudinal comprendido entre los 700 m. y 1000 m. Presenta una generación anual de Julio a Septiembre, apareciendo las ninfas en el mes de Junio. Suele encontrarse sobre pequeñas matas, permaneciendo inmóvil aún cuando es acosado. Se distribuye por el centro, sur y este de la Península, islas del Mediterráneo, centro y oeste de Asia y norte de Africa. Se trata de un elemento mediterráneo-turánico.

*Geomantis larvoides* Pantel, 1896

## MATERIAL ESTUDIADO

**Corral.**- 2 ♂♂, 4 ♀♀, 28-VI-90; 1 ♀, 26-VII-90; 1 ♂, 29-VIII-90. **C. Tiro.**- 2 ♀♀, 28-VI-90; 1 ♂, 29-VIII-90. **Puntal de Meca.**- 1 ♂, 28-VII-90.

Todas las capturas fueron realizadas entre los 900 m. y 1000 m. de altitud. Presenta una generación anual de Junio a Agosto, con máximo poblacional en el primer mes del ciclo. Localizada directamente sobre el sustrato, en zonas pedregosas y aclaradas de vegetación, donde se mimetiza con gran efectividad. Es característica su rapidez de desplazamiento. Se distribuye por el sur de Francia, islas del mediterráneo, Italia y norte de Africa. En la Península Ibérica se presenta por la región mediterránea y meseta norte. Es un elemento mediterráneo occidental.

## EMPUSIDAE

## EMPUSINAE

*Empusa pennata* (Thunberg, 1815)

## MATERIAL ESTUDIADO

**Plaga.**- 3 ♂n, 25-IX-90. **La Cabeza.**- 2 ♀n, 25-IX-90. **Casas.**- 1 ♂n, 25-IX-90. **Carcelén.**- 1 ♂n, 1 ♀n, 25-IX-90. **Vallejo.**- 1 ♂, 17-V-90. **Solana.**- 1 ♂n, 1 ♀n, 24-X-90. **Puntal del Mediodía.**- 1 ♂n, 26-IX-90; 1 ♀n, 24-X-90.

Capturada entre los 800 m. y 1000 m. de altitud. La única captura de individuos en estado adulto se realizó en Mayo, correspondiendo el resto, entre Septiembre y Octubre, a formas ninfales, lo que parece indicar que pasa el invierno en éste estado. Ocupa la parte más elevada de pastizales y matorrales. Se distribuye por Francia, Italia, norte de Africa, la totalidad de la Península Ibérica - excepto Asturias, Santander y País Vasco-, Mallorca y Menorca (Llorente, 1978). Se trata de un elemento mediterráneo occidental.