

pios). Durante estos pasos, muestra predilección por sotos fluviales, así como choperas, olmedas, cultivos frutales, parques y zonas arboladas (Lara y Fajardo, 2001).

No es un ave palustre, por lo que las únicas capturas probablemente se deben a la necesidad de efectuar paradas durante la migración, moviéndose principalmente entre los tarays (*Tamarix sp.*) dispersos alrededor de la laguna.

Pájaro Moscón.- (*Remiz pendulinus*): Familia *Remizidae*, orden *Passeriformes*. Las seis capturas se consiguieron entre noviembre y marzo. Aunque cada vez son más numerosas las localidades con citas de reproducción en la península ibérica, sus efectivos aumentan considerablemente a partir de octubre, con la llegada de individuos invernantes europeos (Tellería et al. 1999).

En Albacete hemos capturado moscones entre octubre y mayo (máximos en octubre y noviembre), siempre en parajes con carrizo o espadañas y en pequeño número (datos propios).

Durante el trabajo de campo en la laguna de Ontalafia, se manifestó claramente como invernante, aunque con bajo número de efectivos.

Alcaudón Real.- (*Lanius excubitor*): Familia *Laniidae*, orden *Passeriformes*. A primeros de octubre se anilló el único individuo de esta especie. En la Península Ibérica parece preferir ambientes cálidos dis-



Alcaudón Real (*Lanius excubitor*)