

parte de la Península Ibérica y aunque existen evidencias de algunos desplazamientos, se considera una especie básicamente sedentaria (Tellería et al. 1999).

En Albacete se ha anillado en todos los meses del año, con mayor número de capturas precisamente durante el mes de mayo (datos propios).

Se reproduce en las casas y granjas cercanas, visitando la laguna esporádicamente para beber o alimentarse. A partir de septiembre, formó un dormitorio comunal entre la vegetación que cubre una isleta situada en la zona central de la laguna.

Gorrión Común.- (*Passer domesticus*): Familia *Passeridae*, orden *Passeriformes*. Con 146 capturas fue la segunda especie más abundante. Se trata de un ave bien distribuida por toda la Península y Baleares, especialmente en asentamientos humanos. Aunque parece ser básicamente sedentario, en ciertos medios padece oscilaciones numéricas que podrían significar cierto grado de movilidad (Tellería et al. 1999).

Presente en Albacete en todos los meses del año, con máximos poblacionales en julio (probablemente debido al masivo abandono de los nidos por parte de los jóvenes) y siempre en zonas humanizadas (datos propios).

Se capturó en la laguna entre mayo y septiembre (excepto una captura en marzo), con máximos en junio. Su presencia se debe a la proximidad de la aldea-granja de Ontalafía cercana, donde se reproduce, utilizando la laguna principalmente como bebedero y zona de forrajeo.

Pinzón Vulgar.- (*Fringilla coelebs*): Familia *Fringillidae*, orden *Passeriformes*. Tres capturas (noviembre y diciembre). Una especie forestal que cría por gran parte de la Península y Baleares, repartiéndose por todo tipo de bosques, campiñas arboladas, huertos y jardines. Durante el invierno, se produce un desplazamiento generalizado desde las áreas forestales donde nidifica, hacia medios más abiertos, recibiendo además aportes de aves invernantes europeas (Tellería et al. 1999).

Para Albacete, disponemos de anillamientos en todos los meses del año, con máximos poblacionales durante agosto en las zonas más forestales y noviembre en cultivos y zonas más abiertas.

En la laguna de Ontalafía, se mostró como un invernante escaso, haciendo uso de la vegetación perilagunar solamente como dormitorio otoño-invernal. Durante gran parte del año, resulta abundante en los pinares que rodean la zona estudiada.

Verdecillo.- (*Serinus serinus*): Familia *Fringillidae*, orden *Passeriformes*.