

También tres capturas. Se reproduce por toda la Península, aunque parece preferir los ambientes más mediterráneos. Además de la llegada de aves invernantes europeas, con la llegada del otoño también, se observan en la Península fuertes desplazamientos de individuos del norte y centro peninsular hacia sectores con clima más suave (Asensio, 1984).

En la provincia de Albacete está presente durante todo el año, registrándose los máximos poblacionales a lo largo del mes de julio (datos propios).

Aunque abundante en los pinares y cultivos próximos a nuestra laguna, solamente la capturamos y de forma escasa entre junio y julio. Su presencia en la laguna parece esporádica, y seguramente se deba a la necesidad de beber.

Jilguero.- (*Carduelis carduelis*): Familia *Fringillidae*, orden *Passeriformes*. Entre abril y agosto se consiguieron las 12 capturas de esta especie. Se distribuye por la Península Ibérica siguiendo un patrón dependiente de la temperatura, abundando en los sectores más térmicos (Tellería y Santos, 1994). Es un migrador parcial que con el otoño abandona mayoritariamente sus localidades de cría para desplazarse al norte de África. La Península, recibe invernantes procedentes de Europa Central (Asensio, 1984).

Nuestros datos para Albacete, confirman su presencia en todos los meses del año, alcanzando los máximos poblacionales a lo largo de octubre. Gusta de sotos fluviales, cultivos y espacios abiertos (datos propios).

Durante el presente estudio, se comportó en la laguna como estival (todas las capturas entre abril y agosto), llegando a verificarse su reproducción en un Taray (*Tamarix. sp.*) situado dentro del cinturón perilagunar.

Pardillo Común.- (*Carduelis cannabina*): Familia *Fringillidae*, orden *Passeriformes*. La única captura se produjo en junio. Este pajarillo cría de forma abundante y dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares, ocupando cualquier medio deforestado (Tellería et al. 1999). Durante el otoño, nuestra Península recibe pardillos comunes migrantes procedentes de gran parte de Europa, a los que probablemente se unen aves ibéricas que tienden a dirigirse hacia la mitad sur peninsular (Asensio, 1984).

Nosotros tenemos anillamientos en la provincia de Albacete a lo largo de todo el año, con densidades mensuales similares, aunque durante la primavera (marzo-junio), resulta algo más abundante (datos propios).

Solamente efectuamos una captura en la laguna, pero al igual que con el Jilguero, pudimos comprobar su reproducción en el área de estudio al encontrar un nido ocupado entre la vegetación lagunar.