

do de 8 a 14 especies. Aunque el Carricero Común sigue siendo de lejos la especie más abundante, aparecen un importante número de especies ya en paso migratorio como Buscarla Pintoja (*L. naevia*), Zarcero Común (*H. polyglotta*), Mosquitero Común (*Ph. Collybita*), Mosquitero Musical (*Ph. Trochilus*), Papamoscas Gris (*M. striata*) o Alcaudón Común (*L. senator*). Llegan los primeros Ruiseñores Bastardos (*C. cetti*) y se anilla el único ejemplar de Abejaruco Común (*M. apiaster*). Desaparece de la laguna el Carricero Tordal y disminuye casi totalmente el Gorrión Común.

**Septiembre.-** Los días 3 y 17 fueron los elegidos para completar las dos sesiones de anillamiento correspondientes a este mes. Se incrementan la abundancia y la diversidad, mientras que la riqueza alcanzó el máximo anual (junto con octubre) de 16 especies. Aunque todavía alta, la dominancia empieza a decrecer, continuando el Carricero Común como especie más abundante, a la vez que siguen capturándose especies en migración: Pechiazul (*L. svecica*), Buscarla Pintoja, Buscarla Unicolor (*L. luscinioides*), Curruca Mosquitera (*S. borin*), Curruca Capirotada (*S. atricapilla*), Mosquitero Musical o Papamoscas Cerrojillo (*F. hypoleuca*). Se producen los únicos anillamientos de Buitrón (*C. juncidis*) y la primera captura de Martín Pescador (*A. atthis*), mientras aumentan los efectivos de Ruiseñor Bastardo y se anillan varios Carriceros Tordales, probablemente en paso migratorio. Un Carricero Común anillado el día 17 de este mes fue controlado el 11 de octubre de 2000 por un anillador en el Parque Nacional de Souss Massa (Marruecos), inmerso plenamente en su viaje migratorio.

**Octubre.-** Jornadas de anillamiento los días 8 y 22. Tanto la diversidad (1.84) como la riqueza específica (16) se sitúan en máximos anuales, mientras que disminuye moderadamente la abundancia y de forma más acentuada la dominancia que se sitúa en 37.1 (la mínima anual después de marzo). Todavía es el Carricero Común la especie más abundante, aunque la laguna alberga también buenos contingentes de Ruiseñor Bastardo y Mosquitero Común. La migración otoñal sigue condicionando la llegada de especies migradoras: Bisbita Común (*A. pratensis*), Petirrojo, Pechiazul, Zorzal Común (*T. philomelos*), Buscarla Pintoja, Buscarla Unicolor, Curruca Capirotada, Mosquitero Musical y Alcaudón Real (*L. excubitor*). Se producen dos capturas de Martín Pescador y el único anillamiento de Abubilla (*U. epops*). Durante la jornada del día 8, se controlaron un Carricero Común anillado el 22 de agosto de este mismo año en Erfurt (Alemania) y una Curruca Capirotada que había sido anillada en Lot-Et-Garonne (Francia) el 15 de agosto de 2000.