

7. Sombrero peludo, cubierto de una capa de pelos, más evidente en el margen .....8
7. Sombrero glabro, sin pelos .....9
8. Látex abundante, que vira lentamente al secarse a tonos grisáceos. Carne extremadamente picante. Olor agradable, afrutado. Bajo encinas en suelos calizos ..... *Lactarius mairei*
8. Látex abundante, rápidamente vira a amarillo intenso. Olor afrutado . . . . . *Lactarius citriolens*
8. Látex escaso, inmutable. Olor fúngico no característico. Bajo jaras, en suelos silíceos ..... *Lactarius tesquorum*
9. Látex blanco que vira a color amarillo al oxidarse .....10
9. Látex blanco, inmutable .....11
9. Látex blanco, que al oxidarse, a los pocos minutos, vira a colores violáceos. Sobre suelos silíceos, en jarales ..... *Lactarius cistophilus*
10. Sombrero densamente marcado por numerosos hoyuelos. Viraje del látex lento y a veces poco evidente . . . . *Lactarius mediterraneensis*
10. Sombrero liso, sin hoyuelos, con zonaciones evidentes. Viraje del látex muy rápido, en menos de un minuto ..... *Lactarius chrysorrheus*
11. Setas medianas, robustas, de entre 6 y 12 cm de diámetro, con sombrero zonado, color crema ..... *Lactarius zonarius*
11. Setas pequeñas, de hasta 6 cm de diámetro, con sombrero de color uniforme, homogéneo, no zonado .....12
12. Pie con la base cubierta de un fieltro aterciopelado . *Lactarius rufus*
12. Pie con la base glabra, sin pelo .....13
13. Seta uniformemente anaranjada ..... *Lactarius mitissimus*
13. Seta de color marrón rojizo. Pie estriado bajo las láminas .....  
 ..... *Lactarius hepaticus*