

- Pelos glandulares dispersos. Lámina ovado-lanceolada. Pecíolo menos de dos veces la longitud de la lámina ..... *Cheilanthes tinaei*
20. Pseudoindusio fimbriado.....*Cheilanthes acrostica*  
 - Pseudoindusio entero o denticulado ..... *Cheilanthes maderensis*
21. Hojas de tamaño considerable (0,5-1 m). Indusio reniforme. Lámina bipinnada..... 22  
 - Hojas de tamaño más reducido. Indusios cuculados o laterales ..... 24
22. Pecíolo y raquis muy paleáceo. Pínnulas con los lados paralelos, enteras o lobuladas ..... *Dryopteris affinis*  
 - Pecíolo paleáceo sólo en la base ..... 23
23. Lámina e indusio sin glándulas..... *Dryopteris filix-mas*  
 - Lámina densamente glandulosa, triangular lanceolada. Dientes grandes y agudos en el ápice de los segmentos de último orden .....  
 ..... *Dryopteris submontana*
24. Indusio lanceolado, cuculado. Lámina de lanceolada a ovado-lanceolada ..... 25  
 - Indusio lateral ..... 26
25. Esporas con espinas cónicas .....*Cystopteris fragilis*  
 - Esporas rugosas, con la superficie granulosa .....*Cystopteris dickieana*
26. Hojas simples, segmento terminal rómbico ..... *Asplenium celtibericum*  
 - Hojas pinnadas..... 27
27. Lámina simplemente pinnada ..... 28  
 - Lámina 2-4 veces pinnada ..... 29
28. Lámina y peciolo cubiertos densamente de pelos glandulosos.....  
 .....*Asplenium petrarchae* subsp. *petrarchae*  
 - Lámina y peciolo glabros ..... 33
29. Planta de pequeño tamaño. Pecíolo verde, castaño sólo en la base. Pínnulas romboidales ..... *Asplenium ruta-muraria*  
 - Planta de mayor tamaño ..... 30