

Género *Palmodes* Kohl, 1890

*Palmodes occitanicus ibericus* (Roth, 1963)

DISTRIBUCIÓN (Mapa 5):

—Península Ibérica.

—España: AV, CU, M, SA, SG, TE, V, VA, Z.

La cita de Mesones es hasta el momento la más meridional de la especie en la península Ibérica.

MATERIAL ESTUDIADO:

Carcelén, 18-VII-91, 1m; Fuensanta, 18-VII-91, 2m; Mesones, 9-VIII-91, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Lamiaceae: *Mentha* sp. 1h.

b) Datos anteriores.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium campestre*, *Thapsia villosa*; Asteraceae: *Centaurea aspera*.

—Terreno: arenoso.

Género *Prionyx* Vander Linden, 1827

*Prionyx kirbii* (Vander Linden, 1827)

DISTRIBUCIÓN:

—Sur de Europa, norte de África y sur del Asia Paleártica.

—España: A, AV, B, BA, BI, BU, CA, CC, CR, CS, GR, HU, M, MU, O, P, PO, SA, SG, SO, T, TO, V, VA, Z, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Agramón, 17-VIII-91, 2h; Alatoz, 18-VII-91, 1h; Donal (La), 8-VIII-91, 3h; Fuensanta, 18-VII-91, 1h; Graya, 8-VIII-91, 4h; Isso, 17-VIII-91, 4m, 5h; Mesones, 9-VIII-91, 2m, 1h; Munera, 17-VIII-91, 1h; Ossa de Montiel, 17-VIII-91, 2h; Paúles, 8-VIII-91, 2h; Roda (La), 17-VIII-91, 2h; Yeste, 8-VIII-91, 4h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium maritimum* 2h, *Foeniculum vulgare* 2m, 7h; Lamiaceae: *Mentha* sp. 1h.

—Terreno: arcilloso-arenoso 2h; arenoso 4m, 10 h; arenoso-pedregoso 2h.

—*Comportamiento nidificador*

En La Donal se localizó un nido de *Prionyx kirbii* situado en terreno arenoso, horizontal y desprovisto de vegetación. El nido presentaba la estructura típica de los nidos de esta especie, con una corta galería (4.5 cm) prácticamente vertical, al final de la cual se disponía la celda, de 4.5 cm de longitud. En esta celda se encontraron tres presas y el huevo del himenóptero. Asimismo, en Yeste se