

ditas o ambas—. *Bractéolas* 0-6, desde menos de 0,5 mm hasta c. 3 mm, anchamente triangulares o lanceoladas, lineares, a veces \pm dentadas. *Flores* pediceladas o subsentadas, más raramente sentadas, pentámeras, con cáliz poco perceptible. *Flores masculinas* con estambres episépalos, con pétalos de c. 1 mm, enteros, subacuminados, alternos a los estambres, lanceolados e incurvados hacia dentro –más acusadamente hacia el ápice–, primero verdes con estrecho margen blanco, luego generalmente en el dorso y a veces también ligeramente en la cara interna purpúreo o violeta; estilopodio con margen lobulado –más evidente tras la antesis– y en ocasiones con rudimentos estilares. *Flores femeninas* con 5 pétalos puntiagudos de c. 0,5 mm, anchamente ovados, brevemente apiculados, con apículo curvado hacia el interior, apenas patentes en la antesis, generalmente teñidos de color rosa o purpúreo; gineceo con 2 carpelos cuyos ovarios en la cara externa son manifiestamente rugosos, en la mayoría de los casos además hispídulos; estilopodio sobre el cual sobresalen 2 estilos erectos, generalmente reflejos con el tiempo. *Flores hermafroditas* similares a las flores masculinas, con gineceo similar al de las flores femeninas –a veces rudimentario y estéril–. *Pedicelos fructíferos* de hasta 12 mm –de 7 mm en frutos de flores hermafroditas–. A veces fruto más largo que el pedicelo. *Frutos* (1,5)2,5-4,2(4,5) mm, de anchamente ovoides a elípticos, rugosos y frecuentemente hispídulos –rara vez con rugosidad poco aparente–, generalmente comprimidos lateralmente, con carpóforo plano y bífido. *Mericarpos* con 5 costillas primarias subiguales, obtusas, prominentes, generalmente hispídulas; pericarpio con pliegues \pm alargados, tuberculados o verruciformes –menos evidentes tras la madurez–; sin ninguna costilla secundaria.

Habita en colinas y lugares montañosos secos sobre suelos calcáreos, principalmente en matorrales abiertos y soleados.

Especie dedicada a la memoria del muy experto botánico Dr. Santiago Castroviejo Bolibar.]

Holotypus: Hispania, ALBACETE: Carcelén, Carretera a Alpera, km 75, 30SXJ458245, 1.067 m, claro en monte pinar con encinas arbustivas y aclarado. 15-7-2010, J. Gómez. ALBA 7954 (Fig. 2 y 3).

Isotypi adsunt in MA 882989, et herb. J. GÓMEZ 2771.

Paratypi adsunt in VAL 222906, et in herb. J. GÓMEZ 803, 1034, 1580, 2718, 2741, 2742, 2769, 2780 y 3127.

Fotografías: Figs. 4-7 y 10c.