

—España: A, AL, AV, BU, CA, CC, GR, J, HU, M, MA, MU, SA, SO, TO, V, VA, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Bonete, 15-VII-91, 1h; Puente de Torres, 2-VIII-91, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Terreno: arcilloso 1h; arenoso-pedregoso 1h.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857)

DISTRIBUCIÓN (Mapa 16):

—Europa y Turquía.

—España: B, P, SG, SO, T, V.

La cita de Paúles es hasta el momento la más meridional de la especie en la península Ibérica.

MATERIAL ESTUDIADO:

Carcelén, 18-VII-91, 1m; Paúles, 8-VIII-91, 1m; Puente de Torres, 21-VIII-91, 1m.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium maritimum* 1m.

—Terreno: arenoso-pedregoso 1m.

b) Datos anteriores: ver GARCÍA (1990).

Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829)

DISTRIBUCIÓN:

—Europa, noroeste de África y oeste de Rusia.

—España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CR, CS, CU, GE, GR, HU, J, L, M, MA, MU, NA, P, SA, SE, SG, SO, TE, TO, V, VA, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Agramón, 7-VIII-91, 8m; Fábrica Riópar, 9-VIII-91, 1m; Mesones, 9-VIII-91, 3m; Paúles, 8-VIII-91, 1m; Puerto de Torres, 2-VIII-91, 1m, 2h; Valdeganga, 2-VIII-91, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium maritimum* 1h; Ranunculaceae: *Clematis vitalba* 1h.

—Terreno: arcilloso 1m, 1h; arcilloso-arenoso 8m; arenoso 3m; arenoso-pedregoso 1m.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).