

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium maritimum* 1h; *Foeniculum vulgare* 1h; Lamiaceae: *Mentha* sp. 1m.

b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991).

CRABRONINI

Género *Lindenius* Lepeletier et Brullé, 1834*Lindenius ibericus* Kohl, 1905

DISTRIBUCIÓN (Mapa 24):

—Península Ibérica y sur de Francia.

—España: A, AV, B, BA, BU, CR, M, NA, P, SA, SO, TO, VA, VI, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Arroyofrío, 29-VII-91, 2h.

Lindenius mesopleuralis (Morawitz, 1890)

DISTRIBUCIÓN (Mapa 25):

—Italia, Francia y España.

—España: A, V.

MATERIAL ESTUDIADO:

Alatoz, 18-VII-91, 3m; Carcelén, 18-VII-91, 6h.

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794)

DISTRIBUCIÓN:

—Península Ibérica, Italia y sur de Francia.

—España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CR, CS, GE, M, P, PO, SA, SG, SO, TO, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Arroyofrío, 29-VII-91, 1h; Fuensanta, 18-VII-91, 1m.

Género *Crossocerus* Lepeletier et Brullé, 1834*Crossocerus megacephalus* (Rossi, 1790)

DISTRIBUCIÓN (Mapa 26):

—Región Paleártica.

—España: A, B, BA, CC, GE, M, SA.