

Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)

DISTRIBUCIÓN:

—Región Paleártica.

—España: A, AL, AV, B, BI, BU, CA, CC, CO, CR, GE, GR, HU, IB, LE, LO, M, O, P, PO, S, SA, SE, SG, SO, TE, V, VA, Z, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Carcelén, 18-VII-91, 1h; Fuensanta, 18-VII-91, 1h.

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799)

DISTRIBUCIÓN:

—Región Paleártica.

—España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CO, CR, CS, GE, GR, GU, HU, I, LO, M, MA, MU, NA, P, PO, SA, SE, SG, SO, T, TE, TO, V, VA, Z, ZA.

MATERIAL ESTUDIADO:

Alborea, 18-VII-91, 1m; Bonete, 15-VII-91, 2m; Fábrica de Riópar, 9-VIII-91, 1m, 2h; Isso, 7-VIII-91, 4m, 4h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium campestre* 2m; *Foeniculum vulgare* 4m; Lamia-
ceae: *Mentha* sp. 1m, 6h.

b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991).

Cerceris specularis Costa, 1869

DISTRIBUCIÓN (Mapa 44):

—Área mediterránea.

—España: A, AV, B, BU, C, CA, CR, M, SA, SE, SG, V, Z.

MATERIAL ESTUDIADO:

Alatoz, 18-VII-91, 1m; Bonete, 15-VII-91, 1m, 1h.

BIOLOGÍA:

a) Datos obtenidos.

—Vegetación: Apiaceae: *Eryngium campestre* 1m, 1h.

b) Datos anteriores: ver GAYUBO y RUEDA (1992).