

	WH 44	WH 45	WH 46	WH 55	WH 56	WH 58	WH 65	WH 67	WH 68	WH 86
<i>Laeosopis roboris</i> (Esper, 1793)	+	+	+	+						
<i>Callophrys rubi</i> (L., 1758)		x	x	+						
<i>Strymon spini</i> (D. & Schiff., 1775)		x	+	+						
<i>Strymon esculi</i> (Hübner, 1804)	+	+	+	x	□					
<i>Tomares ballus</i> (F., 1787)	+	+		+	+					
<i>Heodes alciphron</i> (Rot., 1775)		+		+						
<i>Lycaena phlaeas</i> (L., 1761)	+	x	x	+	□					
<i>Lampides boeticus</i> (L., 1767)		+	+	+						
<i>Syntarucus piriouthus</i> (L., 1767)		+		+						
<i>Cupido minimus</i> (Fuessli, 1775)			x	+		+				
<i>Cupido sebrus</i> (Hübner, 1823)		x		x						
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)		+	x	+		+				
<i>Glaucopsyche melanops</i> (Boisd., 1828)	+	+		+	+					
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergst., 1779)			+	+	+	+				
<i>Pseudophilotes panoptes</i> (Hübner, 1813)		+	□	+						
<i>Pseudophilotes abencerragus</i> (Pierret, 1837)		+		+					+	
<i>Celastrina argiolus</i> (L., 1758)	+	+	+	x	+					
<i>Plebejus argus</i> (L., 1758)		x	x	+	□			□		
<i>Aricia montensis</i> (Vcrrity, 1928)		x	x	x	□					
<i>Aricia cramera</i> (Eschscholtz, 1821)	+	x	x	+	□					
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rot., 1775)		+								
<i>Agrodiaetus damon</i> (D. & Schiff., 1775)			+							
<i>Agrodiaetus fabressei</i> (Obert., 1910)			+							
<i>Agrodiaetus ripartii</i> (Freyer, 1830)			+	+						
<i>Agrodiaetus escheri</i> (Hübner, 1822)	+	+	+	x						
<i>Agrodiaetus amanda</i> (Schneider, 1791)		+		□	+					
<i>Agrodiaetus thersites</i> (Cantener, 1834)		+	+	x	+					
<i>Plebicula nivescens</i> (Keferstein, 1851)		x	+	x	□					
<i>Lysandra hispana</i> (Her.-Schäf., 1852)		x	+	x	x					
<i>Lysandra albicans</i> (Her.-Schäf., 1851)			+	+						
<i>Lysandra bellargus</i> (Rot., 1775)		+	+	+	+					
<i>Polyommatus icarus</i> (Rot., 1775)		x	x	x	□	+				

n.º de spp. por cuadrícula

8 26 24 29 15 4 — 1 1 —

Número total de especies: 32.

Tabla 1d. Lista y distribución de los Licénidos de las Sierras de Alcaraz y Galar del Mundo.

+: citas de la bibliografía

x: citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□: nuevas citas

Otras especies citadas de Albacete, fuera de la zona: *Zizeeria knysna* (Trimen, 1862) de Hellín, XIII16, (ANDÚJAR et al., 1985).