

estacional, existiendo únicamente en la bibliografía datos estacionales puntuales (ASPÖCK & COL., 1980; MONSERRAT, 1985A; DÍAZ-ARANDA & COL., 1986; DÍAZ-ARANDA & MONSERRAT, 1988A y C; MARÍN & MONSERRAT, 1990; etc.), como en el caso de la especie anterior. Su actividad estacional se extiende durante los meses de junio, julio y agosto, existiendo una extraordinaria actividad de imagos en este último mes, en el que se alcanza el máximo de abundancia estacional. Sin lugar a dudas, se trata de una especie que se encuentra perfectamente adaptada a una actividad eminentemente estival, desarrollándose prioritariamente en la época de mayor xericidad ambiental.

	AB	M	JN	JL	AG	S	O	TOTAL
<i>R.castellana</i>			3					3
<i>M.trigrammus</i>				3	4	2		9
<i>M.appendiculatus</i>				1	7			8
<i>N.nemausiensis</i>					1			1
<i>N.arenarius</i>				1				1
<i>C.lugdunensis</i>			1	1				2
<i>L.longicornis</i>				1				1
<i>L.ictericus</i>				1				1
<i>L.baeticus</i>				3				3
<i>D.dusmeti</i>				3				3
<i>N.bipennis</i>			2					2
<i>D.dissimilis</i>				1				1
<i>M.styriaca</i>				1				1
<i>S.elegans</i>			1					1
<i>S.pygmaeus</i>			2		1			3
<i>C.viridana</i>			3	1				4
<i>C.regalis</i>				1				1
<i>M.prasinus</i>		6	17	5	9	3		40
<i>M.venosus</i>			1					1
<i>M.flavifrons</i>			2	1	1		1	5
<i>M.granadensis</i>					1			1
<i>M.picteti</i>			1			2		3
<i>M.ibericus</i>			4	2				6
<i>C.camea</i>	3			10	3	15	9	40
<i>C.mediterranea</i>		1			1	3	2	7
<i>C.baetica</i>					1	3		4
<i>A.loewii</i>				1				1
<i>A.maculata</i>			2		15			17
<i>A.iberica</i>			2		11	2		15
<i>H.pseudolutca</i>				2				2
<i>C.parthenia</i>		3	2		3	5		13
<i>C.borealis</i>	1	3	2	8		7		16
<i>C.ezequi</i>		1			5			6
<i>C.haematica</i>				1				1
<i>C.tjedeni</i>		8	12	6	2			28
<i>C.atlasensis</i>					2			2
<i>S.aleyrodiformis</i>			3					3
<i>H.pallida</i>			1	2	19			22
TOTAL	4	22	61	51	86	42	12	278

Tabla XXXII: Número de ejemplares de cada especie colectados en cada uno de los meses muestreados en el conjunto de los biotopos. Se anotan también el número total colectado por especie, así como el total de ejemplares colectados por mes.