

Género y especie	WH	WH	WH	WH	WH	WH	WH	XII
	44	45	46	55	56	58	65	16
Subfamilia Heliothinae								
<i>Heliothis armigera</i> (Hübner, 1808)	•	•	•	•	×	•	•	+
<i>Heliothis peltigera</i> (D. & Schif., 1775)	+				×	•	+	
<i>Heliothis virescens</i> (Hufnagel, 1766)			+				+	
<i>Rhodocleptia incarnata</i> (Freyer, 1858)	+		•	•	+		•	
n.º de spp. por cuadrícula	2	1	2	—	3	—	2	
Número total de especies: 4.								
Subfamilia Nolinae								
<i>Meganola strigula</i> (D. & Schif., 1775)	•	□	•	•	•	•	•	
<i>Nola togatalis</i> (Hübner, 1796)	•	•	•	+	•	•	•	
n.º de spp. por cuadrícula	—	1	—	1	—	—	—	
Número total de especies: 2.								
Subfamilia Noctuinae								
<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1805)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Agrotis dirempta</i> (Staud., 1859)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Agrotis exclamationis</i> (L., 1758)	+	•	+	+	×	•	•	(3) +
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	•	•	•	•	+	•	•	+
<i>Agrotis obesa</i> (Hübner, 1827)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1805)	•	+	□	•	•	•	•	
<i>Agrotis segetum</i> (D. & Schif., 1775)	•	•	•	•	×	•	•	(4) +
<i>Cerastis faceta</i> (Treitschke, 1855)	•	•	•	+	•	•	+	
<i>Cladocerotis optabilis</i> (Boisduval, 1852)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Eugnorisma pontica</i> (Staud., 1891)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Euxoa obelisca</i> (D. & Schif., 1775)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Noctua comes</i> (Hübner, 1815)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	+	•	•	•	+	•	•	
<i>Noctua janthina</i> (D. & Schif., 1775)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766)	•	□	□	•	□	•	•	
<i>Noctua pronuba</i> L., 1758	+	×	×	+	×	+	+	+
<i>Ochropleura flammata</i> (D. & Schif., 1775)	•	□	•	+	×	•	•	+
<i>Ochropleura forcipula</i> (D. & Schif., 1775)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Ochropleura leucogaster</i> (Freyer, 1851)	•	•	•	•	•	•	•	+
<i>Ochropleura plecta</i> (L., 1761)	•	+	•	•	+	•	•	
<i>Paradiarsia glareosa</i> (Esper, 1788)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	+	□	•	•	×	•	+	+
<i>Xestia c-nigrum</i> (L., 1758)	•	•	•	•	•	•	•	+
<i>Xestia kermesina</i> (Maville, 1869)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Xestia xanthografa</i> (D. & Schif., 1775)	•	•	•	•	+	•	•	
n.º de spp. por cuadrícula	5	6	4	10	21	1	3	
Número total de especies: 23.								
Subfamilia Ophiderinae								
<i>Aleucanitis cailino</i> (Lefebvre, 1827)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Autophila cataphanes</i> (Hübner, 1815)	•	•	•	•	+	•	•	
<i>Tyta luctuosa</i> (D. & Schif., 1775)	•	□	•	•	+	•	•	+
n.º de spp. por cuadrícula	—	1	—	1	2	—	—	
Número total de especies: 3.								