

lugares si las condiciones son las apropiadas. El más común de este grupo en la provincia de Albacete ***Boletus aereus***

20 Género *Imleria*

Cutícula de color marrón oscuro o pardo. Pie sin ningún tipo de ornamentación, de color marrón claro sobre fondo amarillo. Prefiere los terrenos ácidos y las coníferas para su aparición. En la provincia no se conoce su existencia ***Imleria badia***

21. Géneros *Lanmaoa* y *Hemileccinum*

21a Cutícula de color marrón, de tonos oscuros. Carne que al corte azulea, olor agradable, dulzón en todo el carpóforo. Bajo encinas en suelo ácido..... ***Lanmaoa fragrans***

21b Cutícula de color ocre, dominan las tonalidades claras en la misma. Carne amarillenta, inmutable al corte. La base del pie tiene un peculiar olor a yodo. Bajo frondosas, indiferente edáfico. Común en la provincia..... ***Hemileccinum impolitus***

22 Género *Butyriboletus*

22a Cutícula de color rosado más o menos fuerte.....23

22b Cutícula de otro color24

23a Cutícula de color rosa vivo. Carne que no azulea al corte. Pie de color amarillo con retículo del mismo color. Aparece bajo frondosas en terreno ácido o neutro. Especie rara e interesante, de momento sin localizar en la provincia ***Butyriboletus regius***

23b Cutícula de color pardo rosado, rosa amarronado. Carne que azulea al corte, pie de color amarillo en la parte alta y ocráceo en la base. Especie termófila que aparece bajo frondosas en suelos de toda naturaleza, muy raro ***Butyriboletus pseudoregius***