

**Jacobaea auricula** (Bourg. ex Coss.) Pelsner in *Compositae* Newslett. 44: 5 (2006)

*Senecio auricula* Bourg. ex Coss., Notes Pl. Crit.: 169 (1852)

Planta perenne de la familia *Compositae*, que puede llegar a alcanzar hasta unos 50 cm de altura, con una vistosa roseta de hojas basales suculentas de ápice obtuso o tridentado e inflorescencia corimbiforme y que crece en nuestra zona de estudio en suelos desarrollados sobre sustratos margo-yesíferos. Se distribuye dispersa por la mitad oriental de la Península Ibérica y en una única localidad del N de África (Argelia) (Calvo y Aedo, 2019; Anthos, 2022; GBIF, 2022). Figuras 18-20.

Esta planta ya fue citada en la zona de estudio por nuestro grupo, siguiendo un tratamiento subespecífico propuesto por Ascaso y Pedrol (1991) y De la Torre *et al.*, (1999) como *Senecio auricula* subsp. *castellanus* Ascaso & Pedrol (Gómez, 2006). Basándose en datos filogenéticos de ADN, *Senecio auricula* Bourg. ex Coss. ha sido transferido al género *Jacobaea* Mill. (Pelsner *et al.*, 2006 y 2007). Además, la variabilidad de los caracteres morfológicos, junto a estudios genéticos —en los que se ha incluido material procedente del territorio estudiado (Salmerón *et al.*, 2017; Bobo *et al.*, 2021)—, no permiten, por el momento, un claro reconocimiento de subespecies. La especie está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en la categoría Vulnerable (DOCM, 2001) y la subsp *castellanus* figura dentro de la Lista Roja de la Flora Vasculare Española como VU (vulnerable, según criterios de la UICN. de 1994) (VV.AA., 2000; Bañares *et al.*, 2009).

La cita que se aporta como nueva se sitúa cerca de 1 km, al SE de la primera población citada (Gómez, 2006), constituye la segunda población de esta especie en la zona de estudio, el 18-04-21 se hizo un recuento de unas 330 rosetas, más unas 45 plantas en flor. En la primera población hallada se contabilizaron 1058 individuos (Bañares *et al.*, 2009). En la provincia de Albacete la especie también crece en las inmediaciones de la capital y en Cordovilla (Valdés *et al.*, 1993; Valdés y Gómez, 2018).

**ALBACETE: 30SXJ5551**, 540 m, Balsa de Ves, *pr.* Corral de Caracoles. Monte pinar sobre yesos, J. Gómez, 4-5-99 (J. GÓMEZ 213). **Ibidem**, 530 m, Balsa de Ves, *pr.* Matorral en zona yesosa, J. Gómez, 31-5-04 (MA 716380, ALBA 6364, J. GÓMEZ 1683). **30SXJ5651**, 513 m, Balsa de Ves, *pr.* Sierra Atravesada. Monte pinar con lentiscos y atochas, sobre yesos, J. Gómez, 10-7-20 (v. v.). **Ibidem**, J. Gómez, 18-04-21 (v. v.).

Alonso, M. A. (1999); Anthos (2022); Ascaso, J. y Pedrol, J. (1991); Bañares, A. *et al.* (2009); Barrios de León, S. B. (2013); Bobo, J. *et al.* (2021); Bolòs, O. de y Vigo, J. (1996); Calvo, J. y Aedo, C. (2019); Cirujano, S. (1989), (1990) y (1999); Dantín, J. (1912); De la Torre, A. *et al.* (1996) y (1999); DOCM. (1998) y (2001); GBIF (2022); Gómez, J. (2006); Mota, J. F. *et al.* (2011); Pedrol, J. y Ascaso,