

Molineriella minuta (L.) Rouy, Fl. France 14: 102 (1913)

Aira minuta L., Sp. Pl.: 64 (1753) [basionimo]

Molineria minuta (L.) Parl., Fl. Ital. 1: 236 (1850)

Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 298 (1899)

Hierba anual perteneciente a la familia *Gramineae*, de 2,3 a 16,5 cm de altura, con inflorescencia laxa y difusa, con lema de hasta 1,3 mm y anteras de 0,1 a 0,3 mm, características que por sus menores dimensiones permiten diferenciarla de las otras dos especies ibéricas, *M. australis* (Paunero) E. Rico —con lemas de hasta 1,8 mm y anteras de 0,7 a 1 mm— y *M. laevis* (Brot.) Rouy —con lemas de hasta 2,2(2,5) mm y anteras de 0,6 a 1,4 mm—. En el territorio estudiado crece en pastizales desarrollados sobre antiguos cultivos, en suelos arenosos silíceos compactos. Se distribuye por la región mediterránea, y también aparece introducida en Sudáfrica, en Australia, donde está ampliamente extendida en el S y W, y en Tasmania. En la Península Ibérica aparece dispersa por gran parte de ella, más abundante en el CW y rara en el NE y S, faltando en el extremo N (Cebrino y Romero Zarco, 2017 y 2020; Anthos, 2022; GBIF, 2022; POWO, 2022). Figuras 21-24.

En la Comunidad Valenciana está calificada como muy rara (Mateo y Crespo, 2014) y solamente se conoce de la provincia de Valencia, donde la dieron como novedad Nebot y Mateo (1993: 136), concretamente se ha citado en dos términos municipales, Bocairent y Quatretonda (Cebrino y Romero Zarco, 2017: 208), si bien, en la Base de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, solamente consta el primer municipio (BDBCV, 2022), en el cual también había sido citada *M. laevis* (Serra *et al.*, 2012: 121), pero tras revisión del pliego testigo (VAL 66791) se ha determinado como *M. minuta* (Serra *et al.*, 2019: 188).

La referencia que aquí aportamos corrobora la presencia de *M. minuta* en Cofrentes, donde fue localizada con anterioridad (Gómez, 2011) lo que amplía a un tercer municipio la localización de esta especie en Valencia y por extensión en la Comunidad Valenciana.

VALENCIA: 30SXJ6044, 745 m, Cofrentes, pr. Campichuelo. Pastizal en campo abandonado, *J. Gómez*, 16-3-08 (J. GÓMEZ 2397). **Ibidem**, 751 m, Cofrentes, Los Callejones. Cultivo de almendros abandonado con encinas plantadas, sobre suelo arenoso, *J. Gómez*, 21-3-21 (J. GÓMEZ 3336). **Ibidem**, 751 m, Cofrentes, Los Callejones. Cultivo de almendros abandonado con encinas plantadas, sobre suelo arenoso, *J. Gómez*, 1-4-21 (MA 01-00955717, ALBA 13309, VAL 250067, J. GÓMEZ 3338).

Anthos (2022); BDBCV (2022); Cebrino, J. y Romero Zarco, C. (2017) y (2020); GBIF (2022); Gómez, J. (2011); Mateo, G. y Crespo, M. B. (2014); Nebot, J. R. y Mateo, G. (1993); POWO (2022); Serra, L. *et al.* (2012) y (2019).