

Subtribu Trechina

Trechus (Trechus) quadristriatus (Schrank, 1781)

Elemento holártico. Especie euritópica; marzo a junio y en septiembre. Lagunas de Horna. Ruidera. Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Bembidiini**

Subtribu Tachyna

Elaphropus (Sphaerotachys) hoemorrhoidalis (Ponza, 1805)

Elemento mediterráneo macaronésico. Especie halófila, ripícola; marzo a septiembre. Embalses de Camarillas. Cenajo, Fuensanta y Talave. Lagunas de Corralrubio, Pétrola y Ruidera. Saladar de Cordovilla.

Elaphropus (Tachyura) curvimanus (Wollaston, 1854)

Elemento mediterráneo macaronésico. Especie halófila. Embalse de Taibilla.

Elaphropus (Tachyura) parvulus (Dejean, 1831)

Elemento mediterráneo. Especie halófila, ripícola; mayo. Embalse de Taibilla, Lagunas de Ruidera.

Elaphropus (Tachyura) sexstriatus (Duftschmid, 1812)

Elemento europeo. Especie ripícola; abril a junio. Embalses de Cenajo y Fuensanta.

Tachys (Paratachys) bistriatus (Duftschmid, 1812)

Elemento europeo. Especie halófila, ripícola; marzo a julio y de septiembre a noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas, Fuensanta y Talave. Lagunas de Corralrubio, Pétrola, Ruidera, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Tachys (Tachys) dimediatus Mostschoulsky, 1849

Elemento mediterráneo occidental. Especie halobia, paludícola; marzo a mayo. Embalse de Almansa, Lagunas de Corralrubio, Hoya Rasa, Mojón Blanco, Pétrola, Saladar, y Salobralejo. Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla .

Tachys (Tachys) scutellaris Stephens, 1828

Elemento mediterráneo. Especie halobia; mayo, junio y julio. Lagunas de Corralrubio, Pétrola y Saladar. Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.