

Steropus (Sterocorax) insidiator (Piochard de la Brûlerie, 1872)

Elemento lusitánico. Especie lapidícola: febrero a junio, octubre y noviembre. Embalses de Cenajo y Talave.

Subtribu Molopina

Percus (Pseudopercus) guiraoi Pérez-Arcas, 1869

Elemento levantino. Especie lapidícola: febrero a abril y de octubre a noviembre. Embalses de Cenajo y Talave, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Platynini**

Agonum (Agonum) afrum (Duftschmid, 1812) (*moestum longipenne* Chaudoir, 1854)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila, paludícola: mayo y agosto. Lagunas de Ruidera.

Agonum (Agonum) marginatum (Linnaeus, 1758)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila, paludícola: febrero a julio y noviembre. Embalse de Taibilla, Lagunas de Casas del cerro, Casas de Villora, Ontalafia, Pétrola y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

Agonum (Agonum) muelleri (Herbst, 1784)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila; marzo a junio. Lagunas de Ruidera.

Agonum (Agonum) nigrum Dejean, 1828

Elemento mediterráneo. Especie halófila, ripícola: febrero a junio y en octubre. Lagunas de Pétrola, Saladar y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

Agonum (Agonum) viridicupreum viridicupreum (Goeze, 1777)

Elemento europeo. Especie halófila: marzo a julio. Lagunas de Ontalafia y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan, 1763)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila: febrero a junio y de octubre a noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas, Taibilla y Talave, Lagunas de Arquillo, Casas de Villora, Horna, Ontalafia, Pétrola, Salobralejo y S. Benito, Saladar de Cordovilla.