

*Olisthopus elongatus* Wollaston, 1859

Elemento mediterráneo occidental. Especie higrófila y lapidícola; mayo. Embalse de Fuensanta.

*Olisthopus hispanicus* Dejean, 1828

Elemento mediterráneo occidental. Especie higrófila y paludícola; mayo, junio y octubre. Embalse de Fuensanta.

*Paranchus albipes* (Fabricius, 1801) (*Anchus ruficornis* Goeze, 1777)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila; todo el año. Embalses de Almansa, Camarillas, Taibilla y Talave. Lagunas de Arquillo, Casas de Villora, Pétrola, Ruidera y Saladar, Saladar de Cordovilla.

### Tribu **Sphodrini**

*Calathus (Calathus) fuscipes graecus* Dejean, 1831

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola; junio y noviembre. Laguna del Arquillo.

*Calathus (Bedelinus) circumseptus* Germar, 1824

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola e higrófila; marzo a julio y septiembre. Embalses de Almansa, Cenajo, Taibilla y Talave, Lagunas de Ruidera, Saladar de Cordovilla.

*Calathus (Neocalathus) ambiguus ambiguus* (Paykull, 1790)

Elemento europeo. Especie lapidícola; todo el año. Embalse de Taibilla, Lagunas de Ojos de Villaverde, Pétrola y Saladar.

*Calathus (Neocalathus) cinctus* Motschulsky, 1850

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola; abril a noviembre. Embalse de Taibilla, Lagunas de Pétrola y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

*Calathus (Neocalathus) granatensis* Vuillefroy, 1866

Elemento íbero magrebino. Especie lapidícola y silvícola; todo el año. Embalse de Taibilla, Lagunas de Arquillo, Pétrola y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

*Calathus (Neocalathus) mollis mollis* (Marsham, 1802)

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola; febrero a noviembre. Embalses de Fuensanta, Taibilla y Talave, Lagunas de Arquillo, Pétrola, Ruidera y Salobrelejo, Saladar de Cordovilla.