

*Harpalus (Harpalus) wagneri* Schauberger, 1926

Elemento ibérico. Especie lapidícola: febrero a junio, octubre y noviembre. Embalses de Fuensanta y Taibilla. Laguna de Ojos de Villaverde.

*Ophonus (Hesperophonus) azureus* (Fabricius, 1755)

Elemento paleártico occidental. Especie lapidícola: marzo a junio, septiembre y octubre. Embalse de Taibilla.

*Ophonus (Incisophonus) incisus* Dejean, 1829

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: marzo a junio y septiembre a noviembre. Laguna del Saladar.

*Ophonus (Metophonus) brevicollis* (Audinet-Serville, 1821)

Elemento mediterráneo septentrional. Especie lapidícola: abril y mayo. Lagunas de Ruidera.

*Ophonus (Metophonus) parallelus* (Dejean, 1829)

Elemento europeo. Especie lapidícola: marzo a julio. Laguna del Saladar.

*Ophonus (Ophonus) ardosiacus* Lutshnik, 1922

Elemento mediterráneo septentrional. Especie lapidícola: febrero a julio y octubre a noviembre. Embalses de Almansa y Taibilla. Lagunas de Arquillo y Ruidera. Salinas de Pinilla.

*Ophonus (Ophonus) opacus* (Dejean, 1829)

Elemento mediterráneo occidental. Lapidícola. Embalses de Camarillas y Taibilla.

*Ophonus (Ophonus) sabulicola hispanus* Schauberger, 1926

Elemento mediterráneo septentrional. Especie lapidícola: abril a octubre. Embalse de Camarillas. Lagunas de Arquillo. Salinas de Pinilla.

*Parophonus (Ophonomimus) hirsutulus* (Dejean, 1829)

Elemento mediterráneo. Higrófila. mayo y octubre. Lagunas del Salobralejo y Ojos de Villaverde.

*Pseudoophonus (Platus) calceatus* (Duftschmid, 1812)

Elemento eurosiberiano. Especie lapidícola: agosto. Saladar de Cordovilla.