

## Tribu **Licinini**

### Subtribu Licinina

*Baudia collaris* Motschulsky, 1844 (*anomalus* Perris, 1866; *striatulus* Hansen, 1944)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila. Lagunas de Ruidera.

*Badister meridionalis* Puel, 1925

Elemento paleártico occidental. Especie paludícola, de abril a junio. Lagunas de Ruidera.

*Licinus punctatulus granulatus* Dejean, 1828

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: febrero a julio y octubre a noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas y Talave. Lagunas de Corralrubio, Horna, Ojos de Villaverde, Pétrola y Ruidera, Saladar de Cordovilla.

## Tribu **Oodini**

*Oodes gracilis* A. y J.B. Villa, 1833

Elemento europeo. Especie higrófila. Lagunas de Ruidera.

## Tribu **Chlaenini**

### Subtribu Chlaenina

*Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis* (Fabricius, 1787)

Elemento eurosiberiano. Especie halófila: marzo a junio. Laguna del Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

*Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri* Crotch, 1870

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila: marzo a julio. Lagunas de Horna, Ontalafia, Pétrola y Salobralejo, Saladar de Cordovilla.

*Chlaenius (Chlaeniellus) tristis tristis* (Schaller, 1783)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila. abril. Lagunas de Ruidera.

*Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus* (Paykull, 1790)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila, ripícola y paludícola: