

febrero a noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas, Taibilla y Talave, Lagunas de Casa de Vállora, Pétrola, Ruidera, Saladar, Salobralejo, S. Benito y Sugel, Saladar de Cordovilla.

*Chlaenius (Chlaenites) spoliatus* (Rossi, 1790)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila, ripícola y paludícola; febrero a julio y septiembre a noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas, Fuensanta, Taibilla y Talave, Lagunas de Casas del Cerro, Casas de Vállora, Corralrubio, Horna, Ontalafía, Pétrola, Ruidera, Salobralejo y S. Benito, Saladar de Cordovilla.

*Chlaenius (Chlaenius) festivus velutinus* (Duftschmid, 182)

Elemento mediterráneo. Especie higrófila; enero a octubre. Embalses de Almansa, Camarillas, Fuensanta, Taibilla y Talave, Lagunas de Pétrola y Sugel, Saladar de Cordovilla.

### Tribu **Odacanthini**

*Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767)

Elemento eurosiberiano. Especie higrófila, Lagunas de Ruidera.

### Tribu **Cyclosomini**

Subtribu Masoreína

*Masoreus wetterhallii wetterhallii* (Gyllenhal, 1813)

Elemento paleártico occidental. Especie higrófila, Embalse de Talave, Saladar de Cordovilla.

### Tribu **Lebiini**

Subtribu Cymindidina

*Cymindis (Cymindis) lineola* Dufour, 1820

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola; febrero a julio y octubre y noviembre. Embalses de Almansa, Camarillas, Cenajo, Fuensanta y Talave, Lagunas de Arquillo, Pétrola y Ruidera, Saladar de Cordovilla.