

Sésil: Sentado, sin pie.

Soro: Conjunto de esporangios que se reúnen en grupos, protegidos o no por el indusio.

Subcosmopolita: Casi cosmopolita.

Subentero: Casi entero.

Subgloboso: Casi globoso, casi esférico.

Submarginales: Casi marginales.

Subreniforme: Casi arriñonado.

Subsésil: Casi sésil, casi sentado.

Subulado: Estrechado hacia el ápice hasta rematar en punta.

Tetraédricas: Con cuatro caras.

Tricoma: Sinónimo de pelo.

Trileta: Espora con una marca de tres ramas en el polo proximal que se origina por la división que dio lugar a las esporas de la tétrada.

Truncado: Que remata en un borde o un plano transversal como si hubiera sido cortado.

Tuberculado: Cubierto de bultos o tubérculos.

Univalvo: Con una sola valva.

Vaina: Base de la hoja, más o menos ensanchada que abraza parcial o totalmente la zona en que se inserta.

Vena: Nervio foliar.

Verrucoso: Con prominencias a modo de verrugas sobre la superficie.

Vulnerario: Que favorece la curación de heridas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcaraz, F. (2004). La cubierta vegetal de Albacete: encrucijada de influencias biogeográficas y climatológicas. En: *II Jornadas sobre el medio natural albacetense*. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 652 pp.
- Alcaraz, F. y Sánchez, P. (1988). El paisaje vegetal de la provincia de Albacete. *Al-Basit* 24: 9-44.
- Alonso, M. A. (1999). *Conservación y Biodiversidad de los ecosistemas vegetales de las zonas húmedas salinas de la provincia de Albacete*. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 157 pp.
- Álvarez, I. (1994). *Estudio Florístico del Padrón de Bienservida (Albacete)*. Tesis de Licenciatura Ined. Fac. Biología Univ. Complutense. Madrid.
- Álvarez, I., Herrero, A. y Pajarón, S. (1995). Notas pteridológicas del Padrón de Bienservida (Albacete, España). *Acta Bot. Malacitana* 20: 291-294.
- Bañares, Á. Blanca, G., Güemes, J.C. y Ortiz, S. (Eds.). (2003). *Atlas y libro*