

mediados de agosto o principios de septiembre, alcanzando su mayor desarrollo en este mes y la primera quincena de octubre, momento a partir del cual hace crisis para finalizar en la segunda mitad del mes o primeros días de noviembre.

En 1854, durante los meses de enero a junio, la media mensual de fallecidos asciende a 1,66 y a 6, en Bonete y Alpera respectivamente, aumento en julio, con 8 defunciones en ambos pueblos, por la aparición de algunas enfermedades estivales, y se eleva bruscamente en el período de agosto a octubre, donde se alcanza una media de 10,33 y 53 defunciones, para descender a valores de 3,5 en ambos pueblos durante noviembre y diciembre.

La epidemia de 1855, que sólo afectó a Bonete, siguió una dinámica similar, aunque el contraste entre los primeros meses del año y los tres epidémicos fue mucho mayor que en el año anterior, pasándose de valores medios mensuales de 2, en la primera mitad del año, a 35,33 en el período agosto-octubre, volviendo a la media de 2 en noviembre-diciembre.

La última oleada de 1865 en Alpera, con un desarrollo análogo, pasó de unas defunciones medias mensuales de 5,83 en el primer semestre a volares de 37,33 en el trimestre epidémico, cayendo en el período noviembre-diciembre en una media de 5.

Defunciones medias mensuales en Bonete y Alpera.

Año	ENERO-JUNIO		JULIO		AGOSTO-OCTBRE.		NOVBRE.-DICBRE.	
	Bonete	Alpera	Bonete	Alpera	Bonete	Alpera	Bonete	Alpera
1854	1,66	6	8	8	10,33	53,0	3,5	3,5
1855	2	—	4	—	35,33	—	2	—
1865	—	5,83	—	9	—	37,3	—	5

LA EDAD Y EL SEXO DE LOS AFECTADOS

A grandes rasgos se observa como la mortalidad alcanza los mayores porcentajes en la población más joven, (menores de 10 años) y como a partir de aquí las defunciones, en sentido decreciente, cubren todas las edades, registrándose los mínimos precisamente en los individuos de mayor edad (mayores de 60 años).

En efecto, en 1854 en Alpera, el 30,18% de los fallecimientos por cólera se dan entre los menores de 20 años, de los cuales el 77,77% son a su vez menores de 10 años, destacando el grupo de edad de 1 a 4 años, donde se inserta el 16,10% del total de las defunciones por esta causa, registrando valores mucho más bajos los menores de 1 año y los que cuentan entre 5 y 9 años. Los muertos entre los 20 y los 40 años sólo suponen el 22,79% del total, quedando bien repartidos los porcentajes entre todos los grupos quinquenales, aun-