

bert leg., col. F. Lencina). Nueva también para Castilla-La Mancha, según mapa de distribución de Redondo *et al.* (2009). Elemento tropical. Figura n.º 1.

3.2.2 *Idaea incisaria albarracina* (Reisser, 1934): Puente Tamayo, río Cabriel, Villamalea, 439 m, 30SXJ3358, 5.VII.2003, 1♂; 24.IV.2017, 1♂ (det. J. J. Guerrero) (F. Lencina y F. Albert leg., col. F. Lencina). Elemento atlanto-mediterráneo. Figura n.º 1.

3.2.3 *Idaea deitanaria* Reisser & Weisert, 1977: Barranco del Gamonar, Embalse de Camarillas, Hellín, 350 m, 30SXH1844, 25.III.2005, 1♂ (F. Lencina y F. Albert leg., col. F. Lencina). Nueva también para Castilla-La Mancha, según mapa de distribución de Redondo *et al.* (2009). Elemento endémico. Figura n.º 1.

3.2.4 *Catarhoe basochesiata* (Duponchel, 1831): El Cenajo, río Segura, Hellín, 350 m, 30SXH0748, 28.II.2015, 1♀ (F. Lencina y F. Albert leg., col. F. Lencina). Nueva también para Castilla-La Mancha, según mapa de distribución de Redondo *et al.* (2009). Elemento atlanto-mediterráneo. Figura n.º 1.

3.2.5 *Eupithecia unitaria* Herrich-Schäffer, 1852: El Hondón, río Segura, Hellín, 340 m, 30SXH1247, 25.III.2006, 1♂ (F. Lencina y F. Albert leg., col. F. Lencina). Nueva también para Castilla-La Mancha, según mapa de distribución de Redondo *et al.* (2009). Elemento atlanto-mediterráneo. Figura n.º 1.

### 3.3 Familia Noctuidae

3.3.1 *Cucullia (Cucullia) calendulae* Treitschke, 1835: El Cenajo, río Segura, Hellín, 354 m, 30SX0747, 16.IV.2005, 1♂ (det. J. J. Guerrero) (F. Lencina y F. Albert leg., col. F. Lencina); Cueva de la Vaca, La Celia, Hellín/Jumilla, 645 m, 30SXH3257, 19.XI.2017, 1♂ (det. J. J. Guerrero) (F. Lencina y F. Albert leg., col. F. Lencina). Elemento asiático-mediterráneo. Figura n.º 1.