

- SOUTHWOOD T. R. E. 1978. *Ecological methods*. 2nd ed. Chapman and Hall, London. 524 pp.
- THIELE H.U. 1977. *Carabid Beetles in their environments*. Series in Zoophysiology and Ecology. 10. Springer. Berlin. XVII +369 pp.
- TURIN, H. 1981. *Provisional Checklist of the European Ground-Beetles (Coleoptera, Cicindelidae & Carabidae)*. Monographien van de Ned. Ent. Ver. 9. Amsterdam, 249 pp.
- TURIN H. 2000. *De Nederlandse loopkevers. Verspreiding en Oecologie. (Coleoptera: Carabidae)*. Nederlandse Fauna 3. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis. KNNV Uitgeverij. Utrecht. 666 pp. + 16 plates and CD-ROM.

Cuadro 1

Datos climatológicos de la zona de estudio.

Zona	It	Termótipo	pp (mm)	Ombrótipo	Altitud (m)
Agramón	261	mesomediterráneo	225	semiárido	530
Camarillas	339	mesomediterráneo	311	semiárido	397
Cenajo	299	mesomediterráneo	355	seco	360
Cordovilla	252	mesomediterráneo	324	semiárido	625
Fuensanta	238	mesomediterráneo	342	semiárido	680
Pétrola	225	mesomediterráneo	364	seco	960
Pinilla	228	mesomediterráneo	365	seco	960
Ruidera	224	mesomediterráneo	369	seco	840
Saladar	222	mesomediterráneo	360	seco	880
Salobralejo	225	mesomediterráneo	355	seco	940
Talave	321	mesomediterráneo	294	semiárido	550