

LOCALIDADES	ESPECIES COMUNES	I. Jaccard	I. Czekanowsky
Horna-Ruidera	14	0,159	0,274
Horna-Pétrola	29	0,311	0,475
Horna-Saladar	17	0,233	0,378
Horna-Salobralejo	19	0,275	0,432
Horna-Cordovilla	26	0,230	0,374
Horna-Pinilla	14	0,245	0,394
Ruidera-Pétrola	33	0,264	0,418
Ruidera-Saladar	21	0,200	0,333
Ruidera-Salobralejo	21	0,204	0,339
Ruidera-Cordovilla	34	0,241	0,388
Ruidera-Pinilla	8	0,080	0,149
Pétrola-Saladar	47	0,475	0,644
Pétrola-Salobralejo	41	0,398	0,569
Pétrola-Cordovilla	63	0,477	0,646
Pétrola-Pinilla	23	0,221	0,362
Saladar-Salobralejo	35	0,454	0,625
Saladar-Cordovilla	40	0,325	0,491
Saladar-Pinilla	18	0,234	0,379
Salobr.-Cordovilla	35	0,278	0,435
Salobralejo-Pinilla	18	0,240	0,387
Cordovilla-Pinilla	23	0,190	0,319

### Cuadro 3

Matriz de índices de similitud (Czekanowsky-Sorenson) faunística entre distintos enclaves húmedos de Albacete.

	Fuens.	Talav.	Taibi.	Horna	Ruide.	Pétro.	Salad.	Salob.	Cordo.	Pinil.
Camar.	0,383	0,488	0,323	0,323	0,365	0,355	0,282	0,222	0,312	0,132
Fuens.	-	0,423	0,372	0,197	0,336	0,268	0,189	0,193	0,236	0,053
Talave	-	-	0,432	0,225	0,362	0,309	0,192	0,216	0,418	0,157
Taibilla	-	-	-	0,309	0,391	0,314	0,172	0,235	0,357	0,157
Horna					0,274	0,475	0,378	0,432	0,374	0,394
Ruidera						0,418	0,333	0,339	0,388	0,149
Pétrola							0,644	0,569	0,646	0,362
Saladar								0,625	0,491	0,379
Salobra.									0,435	0,387
Cordov.										0,319