

Cuadro 4

Número de especies y porcentajes de halobios, halófilos y accidentales en distintos enclaves salinos y dulces de Albacete.

LOCALIDADES	Nº total	Halobias	Halófilas	Accidentales
enclaves salinos				
Casas de Villora	24	2 (8,3%)	16 (66,7%)	6 (25%)
Cordovilla	106	11 (10,4%)	43 (40,6%)	52 (49,1%)
Corralrubio	22	6 (27,3%)	9 (40,9%)	7 (31,8%)
Horna	33	7 (21,2%)	14 (42,4%)	11 (33,3%)
Ontalafía	16	1 (6,3%)	10 (62,3%)	5 (31,3%)
Pétrola	89	13 (14,6%)	41 (46,1%)	35 (39,3%)
Saladar	57	10 (17,5%)	27 (43,3%)	20 (35,1%)
Salinas de Pinilla	38	14 (36,8%)	15 (39,5%)	9 (23,7%)
Salobralejo	55	8 (14,5%)	30 (54,5%)	17 (30,9%)
lagunas dulces y embalses				
Emb. Almansa	24	1 (4,2%)	12 (50%)	11 (45,8%)
Emb. Camarillas	35	-	15 (42,8%)	20 (57,1%)
Emb. Fuensanta	38	-	8 (21,1%)	30 (79%)
Emb. Taibilla	64	-	12 (18,8%)	52 (81,3%)
Emb. Talave	47	-	9 (19,1%)	38 (80,9%)
Laguna Arquillo	21	-	7 (33,3%)	14 (66,7%)
Lagunas Ruidera	69	2 (2,9%)	28 (40,6%)	39 (56,5%)