

IV-2013, 2♀♀. Cortijo de Federo, 21-X-2013, 1♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 18♂♂, 7♀♀; 23-X-2013, 5♂♂, 5♀♀. Fuente de la Catarroya, 21-VI-2013, 4♂♂; 23-X-2013, 4♂♂, 1♀. Las Espineras, 18-VI-2013, 1♂; 21-X-2013, 6♂♂, 1♀. Los Carrizales, 20-X-2013, 1♂, 1♀; 21-X-2013, 1♂, 7♀♀. Nacimiento del Río Mundo, 19-VI-2013, 2♂♂; 21-X-2013, 3♂♂, 2♀♀. Puerto de las Crucetas, 18-VI-2013, 6♂♂. Río Segura, 22-X-2013, 32♂♂, 14♀♀. Río Tus, 22-VI-2013, 14♂♂, 5♀♀. Zapateros, 20-X-2013, 5♂♂.

Citas bibliográficas: Alcalá de Júcar; Ayna; Nacimiento del Río Mundo, Río Mundo; Taibilla (Bonada y cols., 2004); Río Arquillo; Río Tus (Bonada y cols., 2008).

Distribución: Europa occidental y norte de África (EO).

Rhyacophila nevada Schmid, 1952

Material estudiado: Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 1♂; 23-X-2013, 1♂.

Citas bibliográficas: Nacimiento del Río Mundo, Río Mundo; Taibilla (Bonada y cols., 2004).

Distribución: Endemismo ibérico (I).

Rhyacophila pascoei McLachlan, 1879

Material estudiado: Río Segura, 22-X-2013, 9♂♂.

Distribución: Holoeuropea (H).

Observaciones: Nueva cita provincial.

GLOSSOSOMATIDAE Wallengren, 1891

Agapetus incertulus McLachlan, 1884

Material estudiado: Arroyo Escudero, 21-VI-2013, 2♂♂; 22-VI-2013, 1♂. Los Chatos, 23-X-2013, 12♂♂.

Distribución: Endemismo íbero-magrebí (IM).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Agapetus nimbulus McLachlan, 1879

Material estudiado: Arroyofrío, 21-X-2013, 3♂♂. Arroyo Morote, 21-VI-2013, 1♂. Fuente de la Plata, 20-VI-2013, 26♂♂. La Ermita, 23-X-2013, 8♂♂. Pedazuelo, 23-X-2013, 1♂.

Distribución: Centrosudeuropea (CSE).

Observaciones: Nuestras citas suponen la segunda captura de esta especie en la península ibérica, desde que fuera citada por primera vez por Zamora-Muñoz y cols. (2006) en Granada. Es por tanto también la primera cita provincial.