

50 en que se distribuía por toda el área estudiada y existía un número considerable de parejas reproductoras (VALVERDE, 1959; CANO Y VALVERDE, 1958; ESPAÑA-PAYA, 1958; HIRALDO et al. 1979) hasta el momento actual en que estimamos la existencia de 1-2 individuos adultos (Ver tabla 2).

#### ALIMOCHÉ *Neophron percnopterus*

Hemos encontrado un total de 19 parejas distribuidas del siguiente modo: 2 en Granada, 13 en Jaén y 4 en Albacete. Aunque la cobertura del censo no la consideramos óptima, estos datos indican que la situación del Alimoche —al cual no se le ha prestado atención hasta ahora— es extraordinariamente precaria, en contra de lo que se suponía hasta el momento.

El veneno es su principal amenaza, sobre todo en las poblaciones existentes en Albacete y Granada.

**TABLA 1 - CENSO DE BUITRERAS (1982-87)**

PROVINCIA DE ALBACETE																		
Buitrera n.º:	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>													
N.º de parejas:	3		—		9													
N.º máx. individuos vistos:	12		6		19													
N.º individuos estimado:	15		10		25													
PROVINCIA DE GRANADA																		
Buitrera n.º:	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>		<u>4</u>		<u>5</u>		<u>6</u>							
N.º de parejas:	13		14		2		1		—		3							
N.º máx. individuos vistos:	45		24		2		1		23		5							
N.º individuos estimado:	55		35		6		2		23		8							
PROVINCIA DE JAÉN																		
Buitrera n.º:	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>		<u>4</u>		<u>5</u>		<u>6</u>		<u>7</u>		<u>8</u>		<u>9</u>	
N.º de parejas:	5		—		2		11		15		—		—		—		—	
N.º máx. individuos vistos:	7		4		7		24		50		3		6		37		3	
N.º individuos estimado:	15		—		—		—		60		—		—		40		—	
	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>			
	2	5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	1	4	9			
	5	10	3	50	20	12	11	8	4	10	35	8	2	10	13			
	15	15	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	2	10	30			