

Cuadro 5

Número de especies y proporciones de los distintos tipos de elementos biogeográficos que presenta la fauna de Carabidae en enclaves húmedos de la provincia de Albacete.

Localidad	Tipo de categoría biogeográfica						nº espec.
	Amplia distribuc.	Europeos	Eurosibe.	Mediterr.	Ibéricos	Orófilos	
Almansa	7 (29,2%)	1 (4,2%)	2 (8,3%)	12 (50%)	2 (8,3%)	-	24
Arquillo	7 (33,3%)	2 (9,5%)	2 (9,5%)	8 (38,1%)	2 (9,5%)	-	21
Camarillas	12 (34,3%)	1 (2,9%)	3 (8,6%)	16 (45,7%)	3 (8,6%)	-	35
Cordovilla	31 (29,2%)	5 (4,7%)	6 (5,7%)	56 (52,8%)	6 (5,7%)	2 (1,9%)	106
Corralrubio	4 (18,2%)	3 (13,6%)	1 (4,5%)	11 (50%)	2 (9,1%)	1 (4,5%)	22
Fuensanta	9 (23,7 %)	3 (7,9%)	1 (2,6%)	21 (55,3%)	4 (10,5%)	-	38
Horna	10 (30,3%)	1 (3%)	2 (6,1%)	18 (54,5%)	2 (6,1%)	-	33
Ontalafía	7 (43,8%)	1 (6,3%)	1 (6,3%)	6 (37,5%)	1 (6,3%)	-	16
Pétrola	22 (24,7%)	5 (5,6%)	6 (6,7 %)	50 (56,2%)	6 (6,7%)	-	89
Pinilla	7 (18,4%)	2 (5,3%)	3 (7,9%)	24 (63,2%)	2 (5,3%)	-	38
Ruidera	24 (34,8%)	6 (8,7%)	7 (10,1%)	26 (37,7%)	6 (8,7%)	-	69
Saladar	14 (24,6%)	5 (8,8%)	6 (10,5%)	31 (54,4%)	1 (1,8%)	-	57
Salobralejo	15 (27,3%)	2 (3,6%)	6 (10,9%)	29 (52,7%)	3 (5,5%)	-	55
Taibilla	18(28,1%)	3 (4,7%)	3 (4,7%)	30(46,9%)	6(9,4%)	4 (6,3%)	64
Talave	13(27,7%)	4 (8,5%)	2 (4,3%)	21(44,7%)	4 (8,5%)	3(6,4%)	47
Víllora	8 (33,3%)	-	2 (8,3%)	12 (50%)	2 (8,3%)	-	24