

HYDROPTILIDAE Stephens, 1836

Stactobia beatensis Mosely, 1934

Material estudiado: Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 6♂♂.

Distribución: Europa meridional (EM).

Observaciones: La presencia de esta especie en Albacete amplía notablemente su área de distribución conocida al sur peninsular. Con anterioridad apenas había sido citada en un par de ocasiones del nordeste de España (Lérida y Navarra) (Schmid, 1952; Martínez y González, 2012). Por tanto es también la primera cita provincial.

Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865)

Citas bibliográficas: Zumeta (Bonada y cols., 2004).

Distribución: Holoeuropea. Presente en el norte de África (H).

Ithytrichia clavata Morton, 1905

Material estudiado: Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 19♂♂. Río Tus, 22-VI-2013, 5♂♂.

Distribución: Holoeuropea. Presente en el norte de África (H).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Oxyethira falcata Morton, 1893

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂. Las Espineras, 21-X-2013, 1♂. Puerto de las Crucetas, 18-VI-2013, 1♂. Río Guadalmena, 20-X-2013, 1♂.

Distribución: Holoeuropea. Presente el norte de África (H).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Oxyethira unidentata McLachlan, 1884

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂.

Distribución: Mediterránea (M).

Observaciones: Nueva cita provincial.

Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994

Material estudiado: Arroyo Morote, 20-VI-2013, 1♂. Cortijo de Piñero, 21-VI-2013, 2♂♂.

Distribución: Endemismo ibérico (I).

Observaciones: Es una especie muy rara, conocida únicamente en la localidad tipo (provincia de Cádiz), de donde fue descrita por González y Cobo (1994) y posteriormente citada de Cuenca por Malicky (1997). Es por tanto la primera cita provincial.