

INTRODUCCIÓN

Albacete es una de las provincias españolas peor prospectadas desde el punto de vista de su batracofauna (Martínez-Rica, 1997). Esto se refleja en el escaso número de información publicada acerca de la distribución de especies de anfibios en esta provincia (González-Paterna, 1988; Lara Pomares, 1995; Sánchez y Rubio, 1996; Vento *et al.*, 2000).

En la provincia de Albacete están presentes dos especies del género *Alytes*: *A. dickhilleni* Arntzen y García-París, 1995 y *A. obstetricans* (Laurenti, 1768). *Alytes dickhilleni* es un endemismo de las Sierras Béticas en sentido amplio cuya distribución se limita a las provincias andaluzas de Almería, Granada, Jaén, Málaga, con citas sin confirmar en Cádiz, y a una pequeña porción del sureste de Castilla-La Mancha y del oeste de Murcia (García-París y Arntzen, 1997). La distribución de la especie en Castilla-La Mancha se reduce a los sistemas montañosos del sur de la provincia de Albacete, de donde ya había sido citado con anterioridad por Palacios *et al.* (1974), Arntzen y García-París (1995), Sánchez y Rubio (1996) y Rubio *et al.* (1998). Estos autores recogen la presencia de la especie en 28 cuadrículas UTM de 10 x 10 km. Además de estas citas la especie se encuentra en cuadrículas compartidas con las provincias de Jaén (Pleguezuelos y Moreno, 1990), Granada (Fernández-Cardenete *et al.*, 2000) y Murcia (Hernández-Gil *et al.*, 1993).

Alytes obstetricans se distribuye por una amplia zona del oeste europeo con citas aisladas en el norte de África. En la Península Ibérica ocupa la mayor parte de la mitad septentrional y una amplia banda litoral mediterránea desde los Pirineos orientales hasta Alicante. Existen citas sin confirmar en Sierra Morena (Pleguezuelos y Moreno, 1990; Márquez y Rosa, 1997). La especie se encuentra muy fragmentada genéticamente y en la Península se reconocen cuatro subespecies: *A. obstetricans obstetricans* (Laurenti, 1768) en los Pirineos occidentales y Cornisa Cantábrica; *A. o. almogavarii* Arntzen y García-París, 1995, extendido con límites imprecisos por los Pirineos centrales y orientales, Cataluña, Aragón y norte de Guadalajara; *A. o. boscai* Lataste, 1879, exclusivo de Galicia, Portugal y Sistema Central Oriental; y el recientemente descrito *A. o. pertinax* restringido a la Comunidad Valenciana, región oriental de Castilla-La Mancha, sureste de Madrid y posiblemente noroeste de Murcia (García-París y Martínez-Solano, 2001). Los únicos datos relativos a la presencia de *A. obstetricans* en Albacete son los recogidos en García-París y Martínez-Solano (2001), que suponen 4 citas en 4 cuadrículas, puesto que todas las citas anteriores corresponden a *A. dickhilleni*. *Alytes obstetricans* se encuentra además en cuadrículas compartidas