

Durante la primavera de 1991, la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) realizó un censo de cría (Lara y Picazo, 1991 en prensa), en el transcurso del cual se verificó la reproducción en la laguna de: Zampullín Común (mínimo 12 parejas), Somormujo Lavanco (mínimo 3 parejas), Zampullín Cuellinegro (al menos 34 parejas), Ánade Azulón (58 pollos), Pato Colorado (3 pollos y 19 jóvenes), Porrón Común (3 pollos al menos), Gallineta Común (1 pollo mínimo), Focha Común, Cigüeñuela, Chorlitejo Chico (al menos 1 pareja), Gaviota Reidora y Fumarel Cariblanco (mínimo 35 nidos ocupados).



Laguna de Ontalafia

## II. MATERIAL Y METODOS

El presente estudio abarca un ciclo anual completo, comenzando el 3 de septiembre del año 2000 y finalizando el 26 de agosto del 2001. Durante este periodo se realizaron dos jornadas mensuales de trampeo (una en cada quincena). Todas las aves se capturaron con un método de trampeo estandarizado que consistió en el empleo únicamente de 10 redes verticales distribuidas entre la vegetación perilagunar, aunque siempre en los mismos lugares. Durante todas las visitas realizadas a lo largo del periodo de estudio, siempre se emplearon las mismas 10 redes (3 de 18 m. de longitud y