

Diversidad.-

El valor calculado para la diversidad se manifestó máximo en otoño (septiembre-diciembre) y mínimo en verano (junio-julio); durante el invierno y la primavera (enero-junio) los índices de diversidad se mantienen en valores medios, excepto en marzo, mes en el que se produce un alto valor de diversidad (Figura 3). Para todo el ciclo anual, la diversidad se estableció en 2.04.




Figura 3.- Valor del índice de diversidad (Shannon-Weaver) en cada periodo mensual.

Dominancia.-

Los valores de dominancia resultaron altos en verano (junio-agosto), febrero y abril, siendo máximo en agosto con 82.8 y mínimos en marzo y octubre con 25.0 y 37.1 respectivamente, durante el resto del ciclo anual se mantuvieron en niveles medios (Figura 4). Para la totalidad del periodo estudiado, la dominancia se estableció en 45.2.

El Carricero Común dominó durante el periodo mayo-octubre, mientras que durante el invierno (diciembre-marzo) la especie dominante fue el Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*); en noviembre y abril dominaron el Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*) y la Golondrina Común (*Hirundo rustica*) respectivamente. Considerando la totalidad del periodo de estudio, la especie dominante fue el Carricero Común.