LAS ESPECIES

Lo específico del método de captura empleado durante este trabajo, puede haber condicionado los resultados en el sentido de que algunas especies por su comportamiento resultan menos "capturables" de lo abundantes que realmente son. Aunque por otro lado a día de hoy, el método de captura aquí empleado es con mucho el más adecuado, cuando se trata de estudiar pequeñas aves palustres.

Andarrios Chico.- (Actitis hypoleucos): Familia Scolopacidae, orden Charadriiformes. Solamente tres capturas (2 abril y 1 mayo) de este pequeño "limícola". Aunque en la Península Ibérica cría de forma dispersa por toda ella (Velasco et al. 1992), las fechas de nuestras capturas están en consonancia con la fenología que muestra la especie en Albacete, con presencia fundamentalmente durante los pasos migratorios, sin tener hasta la fecha citas de reproducción (Campos et al. 2001 y datos propios).

Sin llegar a ser abundante, su presencia en la laguna resulta relativamente normal en las playas formadas entre la vegetación helofítica.



Andarríos Chico (Actitis hypoleucos)

Martín Pescador, (Alcedo atthis): Familia Alcedinidae, orden Coraciiformes. Dos capturas (1 en septiembre y 1 en octubre) y una recaptura (octubre). Se distribuye por toda la Península (Díaz et al. 1996) comportándose mayoritariamente como sedentario, aunque se ha comprobado