

que algunos individuos realizan movimientos intrapeninsulares sin ajustarse a ninguna dirección normativa (Martín y Pérez, 1990).

Entre nuestros datos para Albacete, se cita durante todo el año, con máximos de abundancia en septiembre y octubre.

Su presencia en la laguna probablemente este ligada a la gran abundancia de Gambusias (*Gambusia affinis*), peces de los que se alimenta frecuentemente (observaciones personales).



Martín Pescador (*Alcedo atthis*)

Abejaruco Común.- (*Merops apiaster*): Familia *Meropidae*, orden *Coraciiformes*. La única captura se consiguió en agosto. En España se comporta como estival, aumentando sus efectivos en agosto-septiembre con aves procedentes del sureste francés (Bernis, 1966-1971).

Los once individuos anillados por nosotros en la provincia de Albacete estos últimos años, se capturaron entre abril y septiembre con máximo en julio (Campos et al. 2001 y datos propios).

Aunque el medio palustre no es su entorno preferido, en ocasiones sobrevuela la vegetación perilagunar a la caza de insectos voladores.

Abubilla.- (*Upupa epops*): Familia *Upupidae*, orden *Coraciiformes*. Solo una captura (octubre) de esta conspicua ave, que se distribuye por toda la Península durante el verano (Díaz et al. 1996), aunque existen cada vez mas citas otoño-invernales.