

(1981, 1982, 1983, 1990), CASTILLEJO, RODRÍGUEZ Y OUTEIRO (1989), GIT-
TEMBERGER, BACKHUYS & RIPKEN (1984), PFLEGGER & CHATFIELD
(1988), GERMAIN (1930), QUICK (1960), WIKTOR (1981).

RESULTADOS

En la nueva recolección se ha encontrado una nueva especie que añadir a las anteriormente determinadas. Se trata de *Testacella maugei* FERUSSAC, 1819, que se describe a continuación. Hemos encontrado un solo ejemplar juvenil, en Ossa de Montiel, localidad n.º 39, bajo un tronco en proceso de putrefacción y con gran humedad, en una chopera abandonada en medio de un matorral de sabinas. Por su pequeño tamaño, de apenas 14 mm., no se ha disectado, por lo que la determinación se hace atendiendo a caracteres externos:

Dorso rosa pálido, con profusión de manchas oscuras irregulares. Los surcos salen bien separados de la concha (dimensiones 3 × 2 mm.), la cual cubre toda la parte terminal posterior del animal. Suela de color salmón.

Se ha ilustrado la genitalia de *Arion lusitanicus* y el detalle de la lígula (Fig. 1).

Se cambia la designación de la especie citada en el trabajo anterior como *Arion (Mesarion) subfuscus* (DRAPARNAUD, 1805) por *Arion (Mesarion) gilvus* TORRES MÍNGUEZ, 1925 por apunte de CASTILLEJO Y GARRIDO (in lit. 4-9-92), que preparan una redescipción de esta especie, frecuente en el mediterráneo español.

Se han revisado las tres especies de *Deroceras* que quedaron en nomenclatura abierta, con los siguientes resultados:

Deroceras sp. 1

Se han recolectado 5 nuevos ejemplares, en las localidades 16 y 27 (ambas en Riópar). Finalmente se determinan como: *Deroceras (Agriolimax) nitidum* (MORELET, 1845).

Los ejemplares alcanzan hasta 25 mm. Dorso de color negro brillante y suela ventral tripartita de color crema, a veces con las bandas externas negras. Mucus incoloro. No presentan ciego intestinal, y la masa visceral está recubierta por un tejido conjuntivo disperso de color negruzco. La glándula hermafrodita es pequeña, oscura y redondeada y no llega al fondo del saco visceral. La genitalia es de color gris más o menos oscuro con un pene voluminoso, en general algo más claro y dividido en dos porciones con una constricción entre ellas. La proximal posee entre 4 y 6 apéndices peneanos grandes y festoneados que se unen en la base. La distal está parcialmente recubierta por una capa negruzca de aspecto glandular y alberga el sacobelum, cónico y agudo.