

En Albacete la capturamos entre marzo y octubre con máximo en este último mes (Campos et al. 2001 y datos propios).

Pensamos que su presencia en estos humedales no pasa de ser anecdótica.

Golondrina Común.- (*Hirundo rustica*): Familia *Hirundinidae*, orden *Passeriformes*. Con amplia distribución por toda la Península, aunque parece ser más abundante en la mitad meridional (Tellería et al. 1999). De las 24 capturas efectuadas, 17 (70,8%) se consiguieron el 22 de abril, el resto se reparten entre junio, agosto y septiembre.

Nuestras capturas para la provincia de Albacete, la presentan como una especie estival y de paso, con presencia entre abril y noviembre, aunque alcanza los máximos poblacionales en los primeros días de octubre, coincidiendo con los máximos de paso migratorio postnupcial por Albacete (datos propios). En los últimos años, cuatro individuos anillados por nosotros en diferentes lugares de la provincia de Albacete han sido recuperados fuera de nuestra provincia: Uno en la provincia de Granada y los otros tres en el continente africano: República Sudafricana (Cantos y Gómez-Manzanaque. 1996), Ghana (Cantos y Gómez-Manzanaque. 1999) y Costa de Marfil (comunicación Oficina de Anillamiento del Ministerio de Medioambiente), este último anillado como pollo en nido en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). Por otro lado, hemos recapturado en Albacete una golondrina portadora de anillada holandesa y otra británica.

No resulta raro observar bandos en migración (primavera y otoño) utilizando el entorno lagunar para descansar o alimentarse sobrevolando la vegetación. Durante el verano su presencia en la laguna fue menor de lo esperado.

Bisbita Común.- (*Anthus pratensis*): Familia *Motacillidae*, orden *Passeriformes*. Otra especie con solo una captura. En general, se puede considerar un ave invernante en España (Tellería et al. 1999).

Para Albacete, este bisbita también aparece como una especie netamente invernante, con presencia entre octubre y abril y máximos en diciembre y enero (datos propios).

Su presencia en terrenos abiertos próximos a la laguna resulta relativamente frecuente, pero elude las zonas con vegetación, de ahí su baja tasa de captura.

Bisbita Alpino.- (*Anthus spinoletta*): Familia *Motacillidae*, orden *Passeriformes*. Trece capturas y una recaptura entre noviembre y marzo, lo