

porcentaje de jóvenes y adultos se utilizaron únicamente los datos procedentes de anillamiento y del paso postnupcial. Para la elaboración del mapa de distribución se consideró el número de individuos y en el caso de un registro de 10-12 aves en las lagunas de Ruidera (López-Sánchez, 2006) se consideró el mínimo de 10 individuos en los análisis y representaciones.

Se examinaron las figuras de protección de todos los humedales con presencia de carricerín cejudo de los ámbitos: autonómico (Parque Natural, Reservas Naturales de Castilla-La Mancha y Refugios de Fauna); nacional (Parque Nacional e Inventario Español de Zonas Húmedas); europeo (Red Natura 2000: ZEC Zonas de Especial Conservación y ZEPA Zona Especial Protección para las Aves), o los pertenecientes a alguna figura de conservación internacional (Humedal RAMSAR y Reserva de la Biosfera).

## 2. RESULTADOS

En conjunto se registraron carricerines cejudos en 28 humedales de la comunidad castellano-manchega, 13 en Toledo, 10 en Ciudad Real, dos en Cuenca, dos en Guadalajara y uno en Albacete (tabla 1). Respecto a la tipología de los humedales donde se registra al carricerín cejudo




Figura 1. Fenología anual histórica del carricerín cejudo *Acrocephalus paludicola* en Castilla-La Mancha expresada como número total de individuos (capturas y visuales).