

árboles dispersos, claros y bordes de bosques, siempre que haya matorrales. En los sotos fluviales resulta especialmente abundante (Cantos, 1992 y Tellería et al. 1999).

Las más de 600 fichas de capturas de que disponemos para Albacete se distribuyen desde finales de abril hasta primeros de octubre, con máximos en mayo y junio. En nuestra provincia está bien distribuido, pudiendo encontrarse casi en cualquier paraje arbolado o arbustivo, aunque resulta mucho más abundante en sotos fluviales (Lara y Fajardo, 2001 y datos propios).

En nuestra opinión, podemos calificar su presencia en la laguna de Ontalafia como esporádica durante las épocas de dispersión postgenerativa (verano) y migratoria (primavera y otoño).

Curruca Tomillera.- (*Sylvia conspicillata*): Familia *Sylviidae*, orden *Passeriformes*. La única captura, se produjo el 9 de julio. En la Península Ibérica esta curruca presenta una distribución desigual, siendo más abundante en los sectores semiáridos del sudeste mediterráneo, mostrando preferencia por terrenos secos con abundancia de tomillares y aulagares (Tellería et al. 1999).

Nuestras capturas para Albacete de esta especie se concentran entre primeros de marzo y primeros de octubre con máximos de abundancia en junio.

Al ser un ave de clara preferencia por lugares secos, la captura aquí realizada, no deja de ser a nuestro entender una excepción, explicable solo por los irregulares movimientos dispersivos efectuados por los individuos jóvenes antes de comenzar la verdadera migración hacia el sur.

Curruca Carrasqueña.- (*Sylvia cantillans*): Familia *Sylviidae*, orden *Passeriformes*. También una sola captura (julio). En Iberia durante la época reproductora prefiere las primeras etapas de degradación de encinares y quejigales, donde abundan las malezas de Jaras (*Cistus sp*), aunque también coloniza pinares y sabinares, siempre que presenten un sotobosque arbustivo abundante (Cantos, 1992 y Tellería et al. 1999).

Presente en Albacete entre finales de marzo y principios de octubre, con máximos durante el mes de agosto, fuera de la época reproductora, se la puede encontrar en cualquier zona arbustiva (Lara y Fajardo, 2001).

La única captura en la laguna de esta pequeña curruca evidencia la poca querencia de la especie por este tipo de hábitats.

Curruca Mosquitera.- (*Sylvia borin*): Familia *Sylviidae*, orden *Passeriformes*. Las dos únicas capturas se registraron el 3 de septiembre.