

Respecto a la fenología del carricerín cejudo coincide con los periodos centrales de paso de la especie descritos a nivel nacional (Atienza y cols., 2001; Jubete y cols., 2006). El porcentaje de aves juveniles capturadas en paso postnupcial está próximo al descrito en áreas de la mitad este peninsular (Miguélez y cols., 2014).

Por otro lado, es importante mencionar la enorme importancia de los registros visuales para conocer la distribución del carricerín cejudo en el territorio castellano-manchego, no obstante las observaciones recopiladas en este artículo deben considerarse siempre con cautela dada la dificultad de identificación de esta especie, que puede ser muy fácilmente confundido con el carricerín común *Acrocephalus schoenobaenus*. Entre estas destaca el sorprendente registro de 10-12 aves en las lagunas de Ruidera en septiembre de 2000, si bien ese año coincide con el máximo histórico de capturas anuales en paso postnupcial registrado en España (ARANZADI, 2018; ICONA/SEO, 2018). También destacan los dos registros invernales en Castilla-La Mancha, muy poco usuales en Europa. En España, únicamente existen otros dos registros invernales fuera de este territorio: un ave en la Albufera de Mallorca (Munn, 1921) y un ave en el Delta del Ebro en diciembre de 2009 (Tomàs y cols., 2009; Escandell y cols., 2011). En Francia, las escasísimas citas invernales en la Camarga señalan a una posible confusión con otras especies de aves palustres como el carricerín real *Acrocephalus melanopogon* (Le Névé y cols., 2009), hecho que se puede extender a las citas españolas. Tampoco es habitual la presencia de aves muy tardías durante el paso prenupcial, como la cita de Las Tablas de Daimiel, que es una de las dos únicas citas del mes de junio registradas en España, junto con otra en la localidad de El Grado, en Huesca, el 6 de junio de 1991 (Pérez y Hernández, 2013).

El conjunto de estos datos, en su mayoría precedentes de citas aisladas, bien de observaciones visuales o bien de capturas, ponen de manifiesto que el carricerín cejudo en Castilla-La Mancha es un ave principalmente de paso, pero escasa. No obstante, el número de citas castellano-manchegas es más elevado al existente en otras zonas próximas de la meseta Sur, como Madrid y Extremadura (Atienza y cols.,