

Familia TESTACELLIDAE

Testacella maugei FERUSSAC, 1817

Familia ARIONIDAE

Arion (Arion) lusitanicus MABILLE, 1865

Arion (Mesarion) gilvus TORRES MÍNGUEZ, 1925

Familia LIMACIDAE

Lehmannia (Lehmannia) valentiana (FERUSSAC, 1823)

Familia AGRIOLIMACIDAE

Deroceras (Deroceras) laeve (MÜLLER, 1774)

Deroceras (Agriolimax) agreste (LINNEO, 1758)

Deroceras (Agriolimax) reticulatum (MÜLLER, 1774)

Deroceras (Agriolimax) nitidum (MORELET, 1845)

Familia MILACIDAE

Milax (Milax) gagates (DRAPARNAUD, 1801)

Milax (Tandonia) sowerbyi (FERUSSAC, 1823)

COMENTARIO FINAL

Se amplía el muestreo de la provincia y se confirma la gran semejanza entre la fauna estudiada y la de la región levantina, con 8 de las 10 especies recolectadas comunes a ambas zonas (BORREDÁ, COLLADO y ROBLES, 1990); GASULL (1975). En las localidades de las sierras suroccidentales y sus estribaciones aparece *Deroceras nitidum* que confiere un cierto carácter diferenciador.

Es de notar igualmente, la ausencia de *Milax nigricans*, especie muy similar a *Milax gagates*, bien representada en la provincia. La primera es la especie típicamente mediterránea y la segunda la atlántica (CASTILLEJO, 1981), pero ambas se encuentran incluso en la misma localidad en Valencia. En la provincia de Castellón sólo se ha encontrado *M. nigricans*, según bibliografía (CASTILLEJO y IERMIDA, 1990) y recolecciones iniciadas recientemente por los autores, mientras que en la provincia de Alicante se da el hecho inverso, sólo se encuentra *M. gagates*.

AGRADECIMIENTOS

A Luis Ruano y al Dr. Fernando Robles, por su compañía en las salidas de campo y la recolección de parte del material. Al Dr. José Castillejo por su ayuda y orientación.