es blanca, tornándose amarilla la garganta de los machos en celo. Se ha descrito una coloración de celo de naranja a rojizo en la garganta de los machos (Mellado y Martínez, 1974) que hemos observado en una ocasión en nuestra provincia. Se encuentra habitualmente en zonas boscosas, bordes de río con abundante vegetación y áreas con matorral alto. Es buena trepadora, y puede moverse con facilidad por ramas y troncos. No utiliza madrigueras, sino que se refugia en el interior de la vegetación. Se distribuye por el norte de África y Península Ibérica. Esta lagartija es la más comúnmente observada en nuestra provincia, con 30 observaciones en 14 localidades. Anteriormente se había citado en Riópar (Palacios et al. 1974), Laguna de Villaverde (González et al. 1991), Cenajo (Ruiz et al. 1989) y Albacete. En cuanto a su fenología, los ejemplares se han observado entre mediados de Marzo y finales de Septiembre, por lo que posiblemente el periodo de hibernación en nuestra Provincia se extienda desde Octubre hasta principios de Marzo.

Barrax

30-5-92. 5 ejemplares, entre ellos un juvenil, un ejemplar con la cola en los inicios de la regeneración, y una pareja. Mancha de encinar bajo-coscojar. 15:50.

Casas de Villora

25-4-92. Muchos ejemplares. Al menos una pareja. En típico encinar con sotobosque de coscoja, o bien coscojar. 16:30-17:30.

Cuasiermas

8-9-83.

17-4-87. Un ejemplar macho con coloración naranja en labiales y partes anteriores amarillentas termorregulando en un camino.

18-6-88.

10-6-89.

El Arquillo.

12-4-85. Varios ejemplares.

19-3-87. Varios ejemplares.

23-4-92. Muchos ejemplares. Al menos uno juvenil.

El Zarzalejo.

23-4-92. Ejemplar adulto. 17:45.

Fuente de la Guitarra

21-7-91. Más de 5 ejemplares adultos en un pinar.