

	WH 44	WH 45	WH 46	WH 55	WH 56	WH 58	WH 65	WH 67	WH 68	WH 86
<i>Leptidea sinapis</i> (L., 1758)	+	+	+	×	□	□	□	□	□	□
<i>Aporia crataegi</i> (L., 1758)	□	+	×	+	□	□	□	□	□	□
<i>Pieris brassicae</i> (L., 1758)	□	+	□	+	□	□	□	□	□	□
<i>Pieris rapae</i> (L., 1758)	+	+	×	×	□	□	□	□	□	□
<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	□	+	□	+	□	□	□	□	□	□
<i>Pieris napi</i> (L., 1758)	□	+	+	+	□	□	□	□	□	□
<i>Pontia daplidice</i> (L., 1758)	+	+	×	+	×	□	□	□	□	□
<i>Euchloe ausonia</i> (Hübner, 1804)	□	×	□	+	□	+	□	□	□	□
<i>Euchloe tagis</i> (Hübner, 1804)	□	□	+	+	□	+	□	□	□	□
<i>Anthocharis cardamines</i> (L., 1758)	+	×	×	×	×	□	□	□	□	□
<i>Anthocharis euphenoides</i> (Staud., 1869)	+	×	×	×	□	□	□	□	□	□
<i>Zegris eupheme</i> (Esper, 1782)	□	□	□	+	□	□	□	□	□	□
<i>Colias alfacariensis</i> (Ribbe, 1905)	+	+	+	×	□	□	□	□	□	□
<i>Colias croceus</i> (Geoffroy, 1785)	+	+	×	×	□	□	□	□	□	□
<i>Gonepteryx rhamni</i> (L., 1758)	□	+	×	+	□	□	□	□	□	□
<i>Gonepteryx cleopatra</i> (L., 1767)	□	×	×	+	□	□	□	□	□	□

n.º de spp. por cuadrícula

7 14 14 16 7 2 — — — —

Número total de especies: 16.

Tabla 1c. Lista y distribución de los Piéridos de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+: citas de la bibliografía

×: citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□: nuevas citas

Otras especies citadas de Albacete, fuera de la zona: *Euchloe belemia* (Esper, 1799) de Elche de la Sierra, WH85. (ANDÚJAR et al., 1985).