

| | WH 44 | WH 45 | WH 46 | WH 55 | WH 56 | WH 58 | WH 65 | WH 67 | WH 68 | WH 86 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Leptidea sinapis</i> (L., 1758) | + | + | + | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Aporia crataegi</i> (L., 1758) | □ | + | × | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Pieris brassicae</i> (L., 1758) | □ | + | □ | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Pieris rapae</i> (L., 1758) | + | + | × | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851) | □ | + | □ | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Pieris napi</i> (L., 1758) | □ | + | + | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Pontia daplidice</i> (L., 1758) | + | + | × | + | × | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Euchloe ausonia</i> (Hübner, 1804) | □ | × | □ | + | □ | + | □ | □ | □ | □ |
| <i>Euchloe tagis</i> (Hübner, 1804) | □ | □ | + | + | □ | + | □ | □ | □ | □ |
| <i>Anthocharis cardamines</i> (L., 1758) | + | × | × | × | × | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Anthocharis euphenoides</i> (Staud., 1869) | + | × | × | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Zegris eupheme</i> (Esper, 1782) | □ | □ | □ | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Colias alfacariensis</i> (Ribbe, 1905) | + | + | + | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Colias croceus</i> (Geoffroy, 1785) | + | + | × | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Gonepteryx rhamni</i> (L., 1758) | □ | + | × | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| <i>Gonepteryx cleopatra</i> (L., 1767) | □ | × | × | + | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| n.º de spp. por cuadrícula | 7 | 14 | 14 | 16 | 7 | 2 | — | — | — | — |

Número total de especies: 16.

Tabla 1c. Lista y distribución de los Piéridos de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+: citas de la bibliografía

×: citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□: nuevas citas

Otras especies citadas de Albacete, fuera de la zona: *Euchloe belemia* (Esper, 1799) de Elche de la Sierra, WH85. (ANDÚJAR et al., 1985).